湖南省农业农村厅文件

湘农告〔2020〕4号

湖南省农业农村厅
关于2020年主要农作物品种审定情况的
公　告

湖南省农作物品种审定委员会七届五次主任委员会会议审定通过了柒两优785、先玉1795、湘春2901、湘X1067等121个稻、玉米、大豆、棉花品种，现予公告。

附件：1. 2020年审定通过的主要农作物品种名称

2. 2020年审定通过的主要农作物品种简介

湖南省农业农村厅

2020年3月21日

附件 1

2020 年审定通过的主要农作物品种名称

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20200001	柒两优 785	5
湘审稻 20200002	粮两优芸占	6
湘审稻 20200003	民两优华占	7
湘审稻 20200004	旌优 607	8
湘审稻 20200005	荃优 607	9
湘审稻 20200006	生两优 273	10
湘审稻 20200007	恒丰优金丝苗	11
湘审稻 20200008	泰优金华粘	12
湘审稻 20200009	两优 88	13
湘审稻 20200010	农香 39	14
湘审稻 20200011	农香 42	15
湘审稻 20200012	泉两优芸占	16
湘审稻 20200013	松雅早 1 号	17
湘审稻 20200014	锦两优 8 号	18
湘审稻 20200015	艳两优 039	19
湘审稻 20200016	钰两优 611	20
湘审稻 20200017	钰两优 113	21
湘审稻 20200018	泓两优 503	22
湘审稻 20200019	平两优华占	23
湘审稻 20200020	冠两优华占	24
湘审稻 20200021	悦两优 3189	25
湘审稻 20200022	韵两优隆王丝苗	26

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20200023	韵两优象牙香珍	27
湘审稻 20200024	赞两优 570	28
湘审稻 20200025	民升优丝占	29
湘审稻 20200026	韵两优 128	30
湘审稻 20200027	悦两优 1273	31
湘审稻 20200028	两优 205	32
湘审稻 20200029	裕两优 18	33
湘审稻 20200030	科两优梅占	34
湘审稻 20200031	科裕两优华占	35
湘审稻 20200032	玖两优玖 39	36
湘审稻 20200033	玖两优 1858	37
湘审稻 20200034	泰优 1261	38
湘审稻 20200035	中两优凡 9	39
湘审稻 20200036	玖两优玉占	40
湘审稻 20200037	麓山丝苗	41
湘审稻 20200038	枫林丝苗	42
湘审稻 20200039	隆优 2991	43
湘审稻 20200040	T 两优 131	44
湘审稻 20200041	隆优 2129	45
湘审稻 20200042	五优 3636	46
湘审稻 20200043	隆晶优 4171	47
湘审稻 20200044	陵两优 1309	48

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20200045	浙两优 166	49
湘审稻 20200046	康两优 911	50
湘审稻 20200047	吨两优 17	51
湘审稻 20200048	利两优华晶	52
湘审稻 20200049	望两优 815	53
湘审稻 20200050	圳两优 2018	54
湘审稻 20200051	汉两优 1607	55
湘审稻 20200052	韶优 766	56
湘审稻 20200053	旺两优 911	57
湘审稻 20200054	深优 610	58
湘审稻 20200055	吉优粤占	59
湘审稻 20200056	吉优晶占	60
湘审稻 20200057	创优华九	61
湘审稻 20200058	旺两优 98 丝苗	62
湘审稻 20200059	板仓早糯	63
湘审稻 20200060	板仓早紫	64
湘审稻 20200061	板仓全彩	65
湘审稻 20200062	板仓红糯	66
湘审稻 20200063	湘糯 28	67
湘审稻 20200064	赞两优 13	68
湘审稻 20206001	珂两优 1273	69
湘审稻 20206002	隆 8 优 5438	70
湘审稻 20206003	捷两优 7810	71
湘审稻 20206004	捷两优 8612	72
湘审稻 20206005	莉晶优 4945	73

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20206006	俊两优黄莉占	74
湘审稻 20206007	平两优丝苗	75
湘审稻 20206008	隆 8 优 1308	76
湘审稻 20206009	隆两优 3817	77
湘审稻 20206010	臻两优 3703	78
湘审稻 20206011	靓两优丝苗	79
湘审稻 20206012	韵两优 5438	80
湘审稻 20206013	韵两优 1308	81
湘审稻 20206014	D 两优 8146	82
湘审稻 20206015	玮两优 8612	83
湘审稻 20206016	玮两优 1206	84
湘审稻 20206017	珂两优 8612	85
湘审稻 20206018	隆晶优蒂占	86
湘审稻 20206019	增两优黄莉占	87
湘审稻 20206020	隆晶优 5438	88
湘审稻 20206021	隆晶优 1273	89
湘审稻 20206022	捷两优 1057	90
湘审稻 20206023	彦两优黄莉占	91
湘审稻 20206024	隆晶优 534	92
湘审稻 20206025	五优蒂占	93
湘审稻 20206026	隆香优 1624	94
湘审稻 20206027	泽两优 6502	95
湘审稻 20206028	隆晶优 2911	96
湘审稻 20206029	隆科丝苗 14 号	97
湘审稻 20206030	妙两优 1221	98

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20206031	隆晶优 3135	99
湘审稻 20206032	隆晶优 5842	100
湘审稻 20206033	隆晶优 2636	101
湘审稻 20206034	莉优 1221	102
湘审稻 20206035	妙两优 3287	103
湘审稻 20206036	妙两优 2056	104
湘审稻 20206037	莉优 058	105
湘审稻 20206038	隆科丝苗 13 号	106
湘审稻 20206039	隆晶优 1195	107
湘审玉 20200001	先玉 1795	108
湘审玉 20200002	沣玉 1 号	109
湘审玉 20200003	湘农玉 29 号	110
湘审玉 20200004	湘农玉 27 号	111
湘审玉 20200005	福玉 10 号	112
湘审玉 20200006	玉农晶糯	113
湘审玉 20200007	玉农花彩糯 7 号	114
湘审玉 20200008	甜加糯 968	115
湘审玉 20200009	苏香糯 1875	116
湘审玉 20200010	沣甜糯 3 号	117
湘审玉 20200011	湘农甜玉 3 号	118
湘审玉 20200012	荟甜 192	119
湘审豆 20200001	湘春 2901	120
湘审豆 20200002	湘春豆 30 号	121
湘审豆 20200003	湘春黑豆 31	122
湘审棉 20200001	湘 X1067	123
湘审棉 20200002	中棉所 126	124
湘审棉 20200003	湘 C176	125

附件 2

2020 年审定通过的主要农作物品种简介

审定编号：湘审稻 20200001

品种名称：柒两优 785

申 请 者：湖南杂交水稻研究中心

育 种 者：湖南杂交水稻研究中心、株洲市农业科学研究所

品种来源：株 712S ×R785

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 112.9 天，比对照株两优 819 长 0.2 天。株高 83.5 厘米，亩有效穗 20.5 万穗，每穗总粒数 129.3 粒，结实率 80.0%，千粒重 28.7 克。抗性：叶瘟 5.7 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.0 级，稻瘟病综合抗性指数 5.1，白叶枯病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 69.7%，整精米率 52.6%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 52%，垩白度 13.3%，透明度 1 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 40 毫米，直链淀粉含量 21.8%。

产量表现：2018 年参加湖南省早稻中熟组区域试验，平均亩产 531.5 千克，比对照增产 6.5%；2019 年续试，平均亩产 529.2 千克，比对照增产 6.9%；两年区域试验平均亩产 530.4 千克，比对照增产 6.7%。2019 年生产试验，平均亩产 496.3 千克，比对照增产 6.3%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 20 千克，大田亩用种量 4.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米× 20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 10 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200002

品种名称：粮两优芸占

申 请 者：湖南粮安种业科技股份有限公司

育 种 者：湖南粮安种业科技股份有限公司、邵阳市粮安科学研究院

品种来源：粮 98S×R 芸占

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 138.1 天，比对照 Y 两优 1 号长 1.9 天。株高 117.9 厘米，亩有效穗 15.8 万穗，每穗总粒数 201.2 粒，结实率 88.1%，千粒重 25.8 克。抗性：叶瘟 5.8 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 79.4%，精米率 69.3%，整精米率 60.9%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.0，垩白粒率 33%，垩白度 7.5%，透明度 1 级，碱消值 3.3 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 16.2%。

产量表现：2018 年参加湖南省中稻迟熟组区域试验，平均亩产 711.4 千克，比对照增产 7.0%；2019 年续试，平均亩产 691.9 千克，比对照增产 8.5%；两年区域试验平均亩产 701.7 千克，比对照增产 7.8%。2019 年生产试验，平均亩产 608.4 千克，比对照增产 4.1%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米× 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病、黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200003

品种名称：民两优华占

申 请 者：怀化职业技术学院

育 种 者：怀化职业技术学院

品种来源：民丰 520S ×华占

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 135.7 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.2 天。株高 113.4 厘米，亩有效穗 17.0 万穗，每穗总粒数 206.5 粒，结实率 89.5%，千粒重 23.5 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 79.8%，精米率 70.8%，整精米率 61.7%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 42%，垩白度 12.2%，透明度 2 级，碱消值 3.3 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 22.0%。

产量表现：2018 年参加湖南省中稻迟熟组区域试验，平均亩产 705.5 千克，比对照增产 7.9%；2019 年续试，平均亩产 703.9 千克，比对照增产 10.4%；两年区域试验平均亩产 704.7 千克，比对照增产 9.2%。2019 年生产试验，平均亩产 613.1 千克，比对照增产 4.6%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米× 26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 4 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200004

品种名称：旌优 607

申 请 者：中国种子集团有限公司

育 种 者：中国种子集团有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所

品种来源：德 1A×中种 R1607

特征特性：籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.0 天，比对照 C 两优 343 短 5.0 天。株高 114.3 厘米，亩有效穗 17.7 万穗，每穗总粒数 234.0 粒，结实率 78.1%，千粒重 22.3 克。抗性：叶瘟 3.9 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 82.0%，精米率 71.7%，整精米率 61.8%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 38%，垩白度 12.4%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 40 毫米，直链淀粉含量 17.8%。

产量表现：2018 年参加湖南省中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 677.1 千克，比对照增产 2.6%；2019 年续试，平均亩产 687.4 千克，比对照增产 5.1%；两年区域试验平均亩产 682.3 千克，比对照增产 3.9%。2019 年生产试验，平均亩产 567.0 千克，比对照增产 1.1%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 15 千克，大田亩用种量 2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米× 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200005

品种名称：荃优 607

申 请 者：中国种子集团有限公司

育 种 者：中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司

品种来源：荃 9311A×中种 R1607

特征特性：籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 120.9 天，比对照 C 两优 343 短 0.8 天。株高 123.0 厘米，亩有效穗 17.1 万穗，每穗总粒数 218.1 粒，结实率 84.1%，千粒重 25.2 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 78.0%，精米率 68.0%，整精米率 61.4%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 32%，垩白度 9.4%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 14.2%。

产量表现：2018 年参加湖南省中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 693.5 千克，比对照增产 4.9%；2019 年续试，平均亩产 704.0 千克，比对照增产 7.6%；两年区域试验平均亩产 698.8 千克，比对照增产 6.3%。2019 年生产试验，平均亩产 600.3 千克，比对照增产 6.3%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 15 千克，大田亩用种量 2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米× 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200006

品种名称：生两优 273

申 请 者：湖南杂交水稻研究中心

育 种 者：湖南杂交水稻研究中心

品种来源：生 730S×R273

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.7 天，比对照 C 两优 343 短 6.1 天。株高 119.8 厘米，亩有效穗 16.1 万穗，每穗总粒数 209.1 粒，结实率 85.1%，千粒重 24.6 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 77.2%，精米率 68.9%，整精米率 56.6%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 31%，垩白度 8.6%，透明度 1 级，碱消值 5.5 级，胶稠度 64 毫米，直链淀粉含量 14.0%。

产量表现：2017 年参加湖南省中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 599.3 千克，比对照减产 1.2%；2018 年续试，平均亩产 661.5 千克，比对照增产 0.2%；两年区域试验平均亩产 630.4 千克，比对照减产 0.5%。2018 年生产试验，平均亩产 592.7 千克，比对照增产 3.3%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米× 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200007

品种名称：恒丰优金丝苗

申 请 者：广东粤良种业有限公司

育 种 者：广东粤良种业有限公司

品种来源：恒丰 A×金丝苗

特征特性：籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 107.3 天，比对照岳优 9113 短 5.1 天。株高 101.6 厘米，亩有效穗 23.3 万穗，每穗总粒数 148.6 粒，结实率 84.3%，千粒重 23.7 克。抗性：叶瘟 4.4 级，穗瘟 7.0 级，穗瘟损失率 4.7 级，稻瘟病综合抗性指数 5.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 78.8%，精米率 70.1%，整精米率 64.4%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 23%，垩白度 6.2%，透明度 1 级，碱消值 3.3 级，胶稠度 73 毫米，直链淀粉含量 14.5%。

产量表现：2018 年参加湖南省晚稻中熟组区域试验，平均亩产 656.2 千克，比对照增产 3.5%；2019 年续试，平均亩产 690.7 千克，比对照增产 1.4%；两年区域试验平均亩产 673.5 千克，比对照增产 2.5%。2019 年生产试验，平均亩产 537.6 千克，比对照增产 3.0%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 12-15 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200008

品种名称：泰优金华粘

申 请 者：湖南健为农业科技有限公司

育 种 者：湖南永益农业科技发展有限公司、湖南健为农业科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、益阳市种植业技术推广中心

品种来源：泰丰 A×金华粘

特征特性：籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 111.6 天，比对照岳优 9113 短 0.9 天。株高 113.1 厘米，亩有效穗 24.2 万穗，每穗总粒数 145.0 粒，结实率 82.1%，千粒重 23.8 克。抗性：叶瘟 4.3 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.3，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 68.4%，整精米率 60.3%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.9，垩白粒率 5%，垩白度 0.8%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 15.1%。在 2017 年湖南省第十一次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2018 年参加湖南省晚稻中熟组区域试验，平均亩产 611.2 千克，比对照减产 5.6%；2019 年续试，平均亩产 649.5 千克，比对照减产 3.5%；两年区域试验平均亩产 630.4 千克，比对照减产 4.6%。2019 年生产试验，平均亩产 590.0 千克，比对照增产 5.4%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10-12 千克，大田亩用种量 1.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200009

品种名称：两优 88

申 请 者：湖南省贺家山原种场、湖北大学生命科学学院

育 种 者：湖南省贺家山原种场、湖北大学生命科学学院

品种来源：HD9802S×R88

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 114.8 天，比对照长 2.4 天。株高 111.8 厘米，亩有效穗 23.1 万穗，每穗总粒数 149.1 粒，结实率 84.4%，千粒重 27.6 克。抗性：叶瘟 4.3 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.3 级，稻瘟病综合抗性指数 4.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.5%，精米率 70.5，整精米率 52.3%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 32%，垩白度 6.6，透明度 1 级，碱消值 3.3 级，胶稠度 77 毫米，直链淀粉含量 14.5%。

产量表现：2018 年参加湖南省晚稻中熟组区域试验，平均亩产 693.6 千克，比对照增产 7.1%；2019 年续试，平均亩产 729.2 千克，比对照增产 8.3%；两年区域试验平均亩产 711.4 千克，比对照增产 7.7%。2019 年生产试验，平均亩产 540.3 千克，比对照增产 3.5%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 12-15 千克，大田亩用种量 1.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 12 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200010

品种名称：农香 39

申 请 者：湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南省水稻研究所

品种来源：粤奇丝苗 2 号×农香 25

特征特性：籼型常规晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 118.7 天，比对照天优华占短 1.2 天。株高 124.6 厘米，亩有效穗 21.5 万穗， 每穗总粒数 151.5 粒，结实率 82.1%，千粒重 23.5 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 6.4 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 77.1 %，精米率 66.5 %，整精米率 53.1%，粒长 7.6 毫米，长宽比 4.4，垩白粒率 1%，垩白度 0.2 %，透明度 1 级，碱消值 6.3 级，胶稠度 64 毫米，直链淀粉含量 14.9 %。在 2015 年湖南省第十次优质稻品种评选中，被评为一等优质稻品种。

产量表现：2018 年参加湖南省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 528.7 千克，比对照减产 13.5%；2019 年续试，平均亩产 643.5 千克，比对照减产 9.8%；两年区试试验平均亩产 586.1 千克，比对照减产 11.7%。2019 年生产试验，平均亩产 558.5 千克，比对照减产 4.9%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 10-15 千克，大田亩用种量 2.5 千克，浸种时用强氯精消毒，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 3-4 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200011

品种名称：农香 42

申 请 者：湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南省水稻研究所

品种来源：湘晚籼 17 号×谷梅 4 号

特征特性：籼型常规晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 117.6 天，比对照天优华占短 2.6 天。株高 111.8 厘米，亩有效穗 21.2 万穗，每穗总粒数 147.0 粒，结实率 85.0%，千粒重 26.2 克。抗性：叶瘟 3.9 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 4.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 79.8%，精米率 70.8%，整精米率 58.3%，粒长 7.6 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 2%，垩白度 0.6%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.4%。在 2017 年湖南省第十一次优质稻品种评选中，被评为一等优质稻品种。

产量表现：2018 年参加湖南省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 550.1 千克，比对照减产 13.4%；2019 年续试，平均亩产 606.6 千克，比对照减产 14.7%；两年区域试验平均亩产 578.4 千克，比对照减产 14.1%。2019 年生产试验，平均亩产 558.4 千克，比对照减产 4.9%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 2.0 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200012

品种名称：泉两优芸占

申 请 者：湖南粮安科技股份有限公司

育 种 者：湖南粮安科技股份有限公司、邵阳市粮安科学研究院

品种来源：泉 298S×R 芸占

特征特性：籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 117.1 天，比对照天优华占短 3.0 天。株高 111.9 厘米，亩有效穗 22.6 万穗，每穗总粒数 166.5 粒，结实率 85.3%，千粒重 23.4 克。抗性：叶瘟 5.2 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.0 级，稻瘟病综合抗性指数 5.0 级，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.6%，精米率 72.0%，整精米率 67.8%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 13%，垩白度 2.6%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 65 毫米，直链淀粉含量 16.2%。

产量表现：2018 年参加湖南省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 643.3 千克，比对照增产 1.3%；2019 年续试，平均亩产 727.5 千克，比对照增产 2.3%；两年区域试验平均亩产 685.4 千克，比对照增产 1.8%。2019 年生产试验，平均亩产 594.7 千克，比对照增产 1.2%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.2 千克，浸种时用强氯精消毒，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病、黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200013

品种名称：松雅早 1 号

申 请 者：湖南桃花源农业科技股份有限公司

育 种 者：湖南桃花源农业科技股份有限公司、湖南省水稻研究所

品种来源：湘早籼 45 号/湘早籼 32 号//华航 31

特征特性：籼型常规早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 110.8 天，比对照株两优 819 长 0.2 天。株高 82.1 厘米，亩有效穗 24.0 万穗，每穗总粒数 98.2 粒，结实率 82.0%，千粒重 25.7 克。抗性：叶瘟 6.4 级，穗瘟 7.0 级，穗瘟损失率 5.0 级，稻瘟病综合抗性指数 5.9，白叶枯病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 77.0%，精米率 63.7%，整精米率 52.0%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 16%，垩白度 5.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 18.3%。

产量表现：2018 年参加湘种联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产 513.6 千克，与对照相当；2019 年续试，平均亩产 476.4 千克，比对照增产 0.2%；两年区域试验平均亩产 495.0 千克，比对照增产 0.1%。2019 年生产试验，平均亩产 472.2 千克，比对照增产 4.6%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 20 千克，大田亩用种量 4.0 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 10-12 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200014

品种名称：锦两优 8 号

申 请 者：湖南桃花源农业科技股份有限公司

育 种 者：湖南桃花源农业科技股份有限公司、湖南省水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：锦 4128S×R8

特征特性：籼型两系杂交中熟早稻品种。在湖南省作早稻中熟栽培，全生育期 109.2 天，比对照株两优 819 短 1.5 天。株高 77.4 厘米，亩有效穗 23.8 万穗，每穗总粒数 110.4 粒，结实率 82.1%，千粒重 25.7 克。抗性：叶瘟 6.0 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 5.4 级，稻瘟病综合抗性指数 6.1，白叶枯病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 77.8%，精米率 64.5%，整精米率 52.4%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 45%，垩白度 12.7%，透明度 2 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 40 毫米，直链淀粉含量 18.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产 533.1 千克，比对照增产 3.8%; 2019 年续试，平均亩产 490.8 千克，比对照增产 3.2%; 两年区域试验平均亩产 512.0 千克，比对照增产 3.5%。2019 年生产试验，平均亩产 478.3 千克，比对照增产 6.3%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 20 千克，大田亩用种量 3.0 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 10-12 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200015

品种名称：艳两优 039

申 请 者：湖南希望种业科技股份有限公司、湖南农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所

育 种 者：湖南希望种业科技股份有限公司、湖南农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所

品种来源：艳 66S×R039

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 110.2 天，比对照株两优 819 短 0.5 天。株高 81.5 厘米，亩有效穗 22.2 万穗，每穗总粒数 130.9 粒，结实率 81.3%，千粒重 24.3 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 2.9，白叶枯病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 77.1%，精米率 64.1%，整精米率 50.8%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 41%，垩白度 13.8%，透明度 2 级，碱消值 3.0 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 12.5%。

产量表现:2018 年参加湖南省湘种联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产 539.0 千克，比对照增产 4.9%；2019 年续试，平均亩产 502.7 千克，比对照增产 5.7%；两年区域试验平均亩产 520.9 千克，比对照增产 5.3%。2019 年生产试验，平均亩产 468.7 千克，比对照增产 4.1%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 20 千克，大田亩用种量 2.0-2.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 10 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200016

品种名称：钰两优 611

申 请 者：湖南隆平高科种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：湘钰 668S×H611

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 111.8 天，比对照株两优 819 长 1.2 天。株高 84.4 厘米，亩有效穗 21.8 万穗，每穗总粒数 131.6 粒，结实率 80.8%，千粒重 24.1 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 3.4 级，穗瘟损失率 1.7 级，稻瘟病综合抗性指数 2.4，白叶枯病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 76.8%，精米率 64.1%，整精米率 52.8%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 48%，垩白度 17.4%，透明度 2 级，碱消值 3.0 级，胶稠度 90 毫米，直链淀粉含量 11.8%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产 517.6 千克，比对照增产 0.7%；2019 年续试，平均亩产 485.7 千克，比对照增产 2.1%；两年区域试验平均亩产 501.7 千克，比对照增产 1.4%。2019 年生产试验，平均亩产 483.0 千克，比对照增产 7.0%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 15 千克，大田亩用种量 1.0-1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省双季稻区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200017

品种名称：钰两优 113

申 请 者：湖南隆平高科种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：湘钰 668S×H113

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 110.8 天，比对照株两优 819 长 0.2 天。株高 88.1 厘米，亩有效穗 21.6 万穗，每穗总粒数 128.6 粒，结实率 83.1%，千粒重 24.5 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 79.2%，精米率 65.6%，整精米率 55.7%，粒长 5.8 毫米，长宽比 2.5，垩白粒率 82%，垩白度 26.0%，透明度 2 级，碱消值 3.0 级，胶稠度 75 毫米，直链淀粉含量 16.6%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产 545.8 千克，比对照增产 6.2%；2019 年续试，平均亩产 501.8 千克，比对照增产 5.5%；两年区域试验平均亩产 523.8 千克，比对照增产 5.9%；2019 年生产试验，平均亩产 479.9 千克，比对照增产 6.4%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 15 千克，大田亩用种量 1.0-1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省双季稻区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200018

品种名称：泓两优 503

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：泓 92S×DF503

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 130.0 天，比对照 Y 两优 1 号短 4.7 天。株高 123.3 厘米，亩有效穗 16.3 万穗，每穗总粒数 193.9 粒，结实率 83.9%，千粒重 25.6 克。抗性：叶瘟 5.3 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 4.4 级，稻瘟病综合抗性指数 5.1，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 68.2%，整精米率 58.4%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 17%，垩白度 3.0%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 71 毫米，直链淀粉含量 13.7%，稻米蒸煮食用感官评价 79.1 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 649.6 千克，与对照相当；2019 年续试，平均亩产 632.2 千克，比对照减产 3.0%；两年区域试验平均亩产 640.9 千克，比对照减产 1.5%。2019 年生产试验，平均亩产 640.6 千克，比对照增产 5.6%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200019

品种名称：平两优华占

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、中国水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：平 S×华占

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 135.0 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.6 天。株高 120.8 厘米，亩有效穗 17.4 万穗，每穗总粒数 192.4 粒，结实率 82.4%，千粒重 25.2 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 80.8%，精米率 69.9%，整精米率 62.0%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 26%，垩白度 6.5%，透明度 1 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 12.7%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 697.6 千克，比对照增产 7.4%; 2019 年续试，平均亩产 691.8 千克，比对照增产 9.4%; 两年区域试验平均亩产 694.7 千克，比对照增产 8.4%。2019 年生产试验，平均亩产 640.1 千克，比对照增产 5.6%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中后期酌情补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200020

品种名称：冠两优华占

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、中国水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：冠 S×华占

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 134.2 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.3 天。株高 118.2 厘米，亩有效穗 17.4 万穗，每穗总粒数 205.3 粒，结实率 85.0%，千粒重 23.1 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 68.1%，整精米率 65.9%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 10%，垩白度 2.7%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 13.0%，稻米蒸煮食用感官评价 77.5 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 703.3 千克，比对照增产 6.5%; 2019 年续试，平均亩产 657.9 千克，比对照增产 3.2%; 两年区域试验平均亩产 680.6 千克，比对照增产 4.9%。2019 年生产试验，平均亩产 644.3 千克，比对照增产 6.3%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 7-8 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200021

品种名称：悦两优 3189

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南亚华种业有限公司

品种来源：华悦 468S×R3189

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 135.6 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.7 天。株高 125.9 厘米，亩有效穗 17.1 万穗，每穗总粒数 174.2 粒，结实率 85.5%，千粒重 26.9 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.2，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 66.7%，整精米率 62.8%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 11%，垩白度 3.0%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 79 毫米，直链淀粉含量 13.0%，稻米蒸煮食用感官评价 82.9 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2017 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 635.0 千克，比对照增产 2.4%; 2018 年续试，平均亩产 629.7 千克，比对照减产 3.5%; 两年区域试验平均亩产 632.4 千克，比对照减产 0.6%。2018 年生产试验，平均亩产 610.9 千克，比对照增产 2.6%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200022

品种名称：韵两优隆王丝苗

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南优至种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：韵 2013S×隆王丝苗

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 118.2 天，比对照 C 两优 343 短 3.0 天。株高 113.6 厘米，亩有效穗 20.3 万穗，每穗总粒数 169.6 粒，结实率 85.3%，千粒重 23.1 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.2%，精米率 68.9%，整精米率 52.1%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 10%，垩白度 3.2%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 14.0%，稻米蒸煮食用感官评价 84.2 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 685.1 千克，比对照增产 2.8%；2019 年续试，平均亩产 632.5 千克，比对照增产 0.3%；两年区域试验平均亩产 658.8 千克，比对照增产 1.6%。2019 年生产试验，平均亩产 582.9 千克，比对照增产 1.1%。

栽培技术要点：5 月下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200023

品种名称：韵两优象牙香珍

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南优至种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：韵 2013S×象牙香珍

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.1 天，比对照 C 两优 343 短 4.2 天。株高 117.0 厘米，亩有效穗 20.1 万穗，每穗总粒数 180.5 粒，结实率 82.5%，千粒重 22.3 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 78.6%，精米率 68.8%，整精米率 48.5%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 24%，垩白度 4.6%，透明度 1 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 13.7%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 663.8 千克，比对照减产 0.2%；2019 年续试，平均亩产 632.5 千克，比对照增产 1.3%；两年区域试验平均亩产 648.2 千克，比对照增产 0.6%。2019 年生产试验，平均亩产 581.9 千克，比对照增产 1.0%。

栽培技术要点：5 月下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200024

品种名称：赞两优 570

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：赞 6158S×K570

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.2 天，比对照 C 两优 343 长 2.3 天。株高 132.6 厘米，亩有效穗 19.9 万穗，每穗总粒数 179.7 粒，结实率 81.8%，千粒重 22.7 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 78.9%，精米率 70.9%，整精米率 52.3%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.9，垩白粒率 18.5%，垩白度 5.4%，透明度 2 级，碱消值 4.5 级，胶稠度 92 毫米，直链淀粉含量 13.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 674.9 千克，比对照增产 3.0%；2019 年续试，平均亩产 632.5 千克，比对照增产 1.3%；两年区域试验平均亩产 653.7 千克，比对照增产 2.2%。2019 年生产试验，平均亩产 598.2 千克，比对照增产 3.8%。

栽培技术要点：5 月下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20200025

品种名称： 民升优丝占

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 民升 A×丝占

特征特性： 籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 124.8 天，比对照 C 两优 343 长 4.0 天。株高 124.6 厘米，亩有效穗 18.9 万穗，每穗总粒数 192.0 粒，结实率 79.4%，千粒重 24.8 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 81.7%，精米率 72.7%，整精米率 58.6%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 24.5%，垩白度 6.9%，透明度 2 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 88 毫米，直链淀粉含量 24.3%。

产量表现： 2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 688.4 千克，比对照增产 3.3%；2019 年续试，平均亩产 647.3 千克，比对照增产 5.9%；两年区域试验平均亩产 667.9 千克，比对照增产 4.6%。2019 年生产试验，平均亩产 606.0 千克，比对照增产 5.1%。

栽培技术要点： 5 月下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200026

品种名称：韵两优 128

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：韵 2013S×GR128

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.1 天，比对照 C 两优 343 短 4.9 天。株高 112.8 厘米，亩有效穗 19.6 万穗，每穗总粒数 180.7 粒，结实率 82.1%，千粒重 22.7 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.1%，精米率 72.0%，整精米率 52.7%，粒长 6.2 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 24%，垩白度 6.2%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 12.7%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 667.9 千克，比对照增产 0.2%；2019 年续试，平均亩产 634.3 千克，比对照增产 2.3%；两年区域试验平均亩产 651.1 千克，比对照增产 1.3%。2019 年生产试验，平均亩产 589.3 千克，比对照增产 2.3%。

栽培技术要点：5 月下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200027

品种名称：悦两优 1273

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华悦 468S×华恢 1273

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.1 天，比对照 C 两优 343 长 2.1 天。株高 115.7 厘米，亩有效穗 19.5 万穗，每穗总粒数 174.9 粒，结实率 83.9%，千粒重 24.1 克。抗性：叶瘟 2.8 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 1.7 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 79.2%，精米率 71.2%，整精米率 63.4%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 12.5%，垩白度 3.2%，透明度 2 级，碱消值 4.3 级，胶稠度 95 毫米，直链淀粉含量 13.3%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 686.4 千克，比对照增产 3.0%；2019 年续试，平均亩产 633.7 千克，比对照增产 2.2%；两年区域试验平均亩产 660.1 千克，比对照增产 2.6%。2019 年生产试验，平均亩产 597.4 千克，比对照增产 3.7%。

栽培技术要点：5 月下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等,重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种,秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200028

品种名称：两优 205

申 请 者：袁氏种业高科技有限公司

育 种 者：袁氏种业高科技有限公司

品种来源：创 5S ×R205

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 125.1 天，比对照 C 两优 343 长 0.4 天。株高 117.5 厘米，亩有效穗 19.4 万穗，每穗总粒数 176.8 粒，结实率 81.6%，千粒重 24.3 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 74.5%，精米率 65.7%，整精米率 45.1%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 30%，垩白度 8.4%，透明度 1 级，碱消值 4.3 级，胶稠度 92 毫米，直链淀粉含量 13.5%。

产量表现：2017 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 607.2 千克，比对照增产 4.1%；2018 年续试，平均亩产 676.1 千克，比对照增产 3.2%；两年区域试验平均亩产 641.7 千克，比对照增产 3.7%。2019 年生产试验，平均亩产 590.5 千克，比对照增产 3.9%。

栽培技术要点：5 月下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200029

品种名称：裕两优 18

申 请 者：湖南科裕隆种业有限公司

育 种 者：湖南科裕隆种业有限公司

品种来源：裕 S×湘恢 18

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 121.7 天，比对照 C 两优 343 长 0.6 天。株高 118.1 厘米，亩有效穗 19.4 万穗，每穗总粒数 191.5 粒，结实率 83.7%，千粒重 22.6 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.3%，精米率 69.9%，整精米率 56.4%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 12%，垩白度 2.8%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 13.4%，稻米蒸煮食用感官评价 80.8 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 647.2 千克，比对照 C 两优 343 减产 2.9%；2019 年续试，平均亩产 655.6 千克，比对照增产 3.5%；两年区域试验平均亩产 651.4 千克，比对照增产 0.3%。2019 年生产试验，平均亩产 607.0 千克，比对照增产 5.3%。

栽培技术要点：5 月 20 日左右播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.85 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×30.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200030

品种名称：科两优梅占

申 请 者：湖南科裕隆种业有限公司

育 种 者：湖南科裕隆种业有限公司

品种来源：科 S×湘恢梅占

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 121.6 天，比对照 C 两优 343 长 0.5 天。株高 119.6 厘米，亩有效穗 18.3 万穗，每穗总粒数 202.9 粒，结实率 83.2%，千粒重 22.5 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 80.7%，精米率 72.6%，整精米率 68.5%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 11.5%，垩白度 2.6%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 15.0%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 683.7 千克，比对照增产 2.8%；2019 年续试，平均亩产 644.1 千克，比对照增产 3.2%；两年区域试验平均亩产 663.9 千克，比对照增产 3.0%。2019 年生产试验，平均亩产 607.8 千克，比对照增产 5.5%。

栽培技术要点：5 月 20 日左右播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.85 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×30.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200031

品种名称：科裕两优华占

申 请 者：湖南科裕隆种业有限公司

育 种 者：湖南科裕隆种业有限公司

品种来源：裕 S×华占

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.0 天，比对照 C 两优 343 短 1.3 天。株高 118.2 厘米，亩有效穗 19.4 万穗，每穗总粒数 183.7 粒，结实率 82.6%，千粒重 22.7 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 80.2%，精米率 70.7%，整精米率 59.3%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 20%，垩白度 4.6%，透明度 1 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 13.1%。

产量表现：2017 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 607.6 千克，比对照增产 1.5%；2018 年续试，平均亩产 684.8 千克，比对照增产 2.8%；两年区域试验平均亩产 646.2 千克，比对照增产 2.2%。2018 年生产试验，平均亩产 593.8 千克，比对照增产 4.0%。

栽培技术要点：5 月 20 日左右播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.85 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×30.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200032

品种名称：玖两优玖 39

申 请 者：湖南金色农丰种业有限公司

育 种 者：湖南金色农丰种业有限公司、湖南省水稻研究所

品种来源：33S×农香 39

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 115.3 天，比对照岳优 9113 长 2.0 天。株高 109.4 厘米，亩有效穗 23.2 万穗，每穗总粒数 146.7 粒，结实率 78.6%，千粒重 24.5 克。抗性：叶瘟 5.0 级，穗瘟 7.0 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 72.8%，整精米率 64.8%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 15%，垩白度 3.9%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 45 毫米，直链淀粉含量 23.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 597.2 千克，比对照增产 3.2%; 2019 年续试，平均亩产 632.7 千克，比对照增产 6.0%; 两年区域试验平均亩产 615.0 千克，比对照增产 4.6%。2019 年生产试验，平均亩产 546.8 千克，比对照增产 2.1%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10-12 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追速肥，巧施穗粒肥。及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、纹枯病、稻飞虱、二化螟等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200033

品种名称：玖两优 1858

申 请 者：湖南金健种业科技有限公司

育 种 者：湖南金健种业科技有限公司、湖南省水稻研究所

品种来源：33S×R1858

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 113.9 天，比对照岳优 9113 长 0.6 天。株高 106.6 厘米，亩有效穗 21.6 万穗，每穗总粒数 175.6 粒，结实率 77.3%，千粒重 23.4 克。抗性：叶瘟 4.2 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.3 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.3%，精米率 73.2%，整精米率 62.2%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 32.5%，垩白度 8.9%，透明度 1 级，碱消值 6.1 级，胶稠度 40 毫米，直链淀粉含量 24.0%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 590.0 千克，比对照增产 4.2%; 2019 年续试，平均亩产 627.6 千克，比对照增产 5.2%; 两年区域试验平均亩产 608.8 千克，比对照增产 4.7%。2019 年生产试验，平均亩产 567.1 千克，比对照增产 5.9%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200034

品种名称：泰优 1261

申 请 者：湖南金健种业科技有限公司

育 种 者：湖南金健种业科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、江西现代种业股份有限公司

品种来源：泰丰 A×16T-1261

特征特性：籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 114.2 天，比对照岳优 9113 长 0.8 天。株高 106.5 厘米，亩有效穗 22.3 万穗，每穗总粒数 154.7 粒，结实率 75.5%，千粒重 24.0 克。抗性：叶瘟 5.5 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.0 级，稻瘟病综合抗性指数 5.0，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 80.4%，精米率 71.8%，整精米率 63.2%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 11.5%，垩白度 2.7%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 17.8%。在 2018 年湖南省第十二次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 584.0 千克，比对照增产 0.9%; 2019 年续试，平均亩产 590.1 千克，比对照增产 2.0%; 两年区域试验平均亩产 587.1 千克，比对照增产 1.5%。2019 年生产试验，平均亩产 561.5 千克，比对照增产 4.8%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200035

品种名称：中两优凡 9

申 请 者：湖南金健种业科技有限公司

育 种 者：湖南金健种业科技有限公司、中国水稻研究所

品种来源：中 18S×凡 9

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 115.4 天，比对照岳优 9113 长 2.0 天。株高 107.7 厘米，亩有效穗 21.0 万穗，每穗总粒数 168.8 粒，结实率 76.8%，千粒重 24.2 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 80.4%，精米率 72.1%，整精米率 66.5%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 17%，垩白度 3.6%，透明度 1 级，碱消值 5.3 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 16.5%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 588.4 千克，比对照增产 5.7%; 2019 年续试，平均亩产 633.9 千克，比对照增产 6.2%; 两年区域试验平均亩产 611.2 千克，比对照增产 6.0%。2019 年生产试验，平均亩产 567.1 千克，比对照增产 5.5%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200036

品种名称：玖两优玉占

申 请 者：湖南恒德种业科技有限公司

育 种 者：湖南恒德种业科技有限公司、湖南省水稻研究所、广东省农业科学院植物保护研究所

品种来源：33S×玉占

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 113.4 天，比对照岳优 9113 短 1.3 天。株高 98.9 厘米，亩有效穗 22.8 万穗，每穗总粒数 150.8 粒，结实率 77.0%，千粒重 23.8 克。抗性：叶瘟 4.2 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.2%，精米率 72.8%，整精米率 68.1%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 31%，垩白度 7.8%，透明度 1 级，碱消值 6.3 级，胶稠度 30 毫米，直链淀粉含量 19.2%。

产量表现：2017 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 577.9 千克，比对照增产 4.2%; 2018 年续试，平均亩产 611.2 千克，比对照增产 6.2%; 两年区域试验平均亩产 594.6 千克，比对照增产 5.2%。2018 年生产试验，平均亩产 548.7 千克，比对照增产 7.2%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200037

品种名称：麓山丝苗

申 请 者：湖南希望种业科技股份有限公司

育 种 者：湖南希望种业科技股份有限公司、湖南农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所

品种来源：Lemont/02428//R180

特征特性：籼型常规晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 116.0 天，比对照岳优 9113 长 2.6 天，株高 107.5 厘米，亩有效穗 24.6 万穗，每穗总粒数 136.9 粒，结实率 79.4%，千粒重 24.2 克。抗性：叶瘟 4.5 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 4.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.2%，精米率 73.5%，整精米率 68.7%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 10.5%，垩白度 2.4%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 51 毫米，直链淀粉含量 20.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 565.0 千克，比对照增产 1.4%；2019 年续试，平均亩产 617.1 千克，比对照增产 3.4%；两年区域试验平均亩产 591.1 千克，比对照增产 2.4%。2019 年生产试验，平均亩产 556.0 千克，比对照增产 3.8%。

栽培技术要点：6 月下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8-10 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200038

品种名称：枫林丝苗

申 请 者：湖南希望种业科技股份有限公司

育 种 者：湖南希望种业科技股份有限公司、中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南农业大学

品种来源：Lemont/02428//YN10

特征特性：籼型常规晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 115.4 天，比对照岳优 9113 长 2.0 天，株高 106.2 厘米，亩有效穗 23.5 万穗，每穗总粒数 142.3 粒，结实率 77.7%，千粒重 24.3 克。抗性：叶瘟 5.2 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 4.4 级，稻瘟病综合抗性指数 5.0，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.0%，精米率 70.7%，整精米率 55.4%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.0，垩白粒率 16%，垩白度 3.8%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 20.6%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 576.5 千克，比对照增产 3.5%; 2019 年续试，平均亩产 620.6 千克，比对照增产 4.0%; 两年区域试验平均亩产 598.6 千克，比对照增产 3.8%。2019 年生产试验，平均亩产 554.9 千克，比对照增产 3.6%。

栽培技术要点：6 月下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8-10 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200039

品种名称：隆优 2991

申 请 者：湖南隆平高科种业科学院有限公司

育 种 者：袁隆平高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆香 634A×华恢 2991

特征特性：籼型三系杂交晚稻中熟品种，在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 113.8 天，比对照岳优 9113 长 0.4 天。株高 110.3 厘米，亩有效穗 22.2 万穗，每穗总粒数 151.6 粒，结实率 80.3%，千粒重 26.0 克。抗性：叶瘟 2.7 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 81.5%，精米率 72.4%，整精米率 60.1%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 20%，垩白度 4.6%，透明度 2 级，碱消值 3.0 级，胶稠度 79 毫米，直链淀粉含量 15.1%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 588.7 千克，比对照增产 5.7%；2019 年续试，平均亩产 623.0 千克，比对照增产 4.4%；两年区域试验平均亩产 605.9 千克，比对照增产 5.1%。2019 年生产试验，平均亩产 576.6 千克，比对照增产 7.6%。

栽培技术要点：湘北 6 月 18 日前播种，湘中南 6 月 20-23 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200040

品种名称：T 两优 131

申 请 者：湖南希望种业科技股份有限公司

育 种 者：湖南希望种业科技股份有限公司、湖南农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所

品种来源：T764S×R131

特征特性：籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 115.3 天，比对照天优华占短 3.5 天。株高 97.8 厘米，亩有效穗 23.2 万穗，每穗总粒数 139.8 粒，结实率 81.7%，千粒重 25.5 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 80.3%，精米率 71.2%，整精米率 52.4%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 14.5%，垩白度 3.7，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 90 毫米，直链淀粉含量 16.6%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 645.8 千克，比对照增产 2.8%; 2019 年续试，平均亩产 622.8 千克，比对照减产 1.0%; 两年区域试验平均亩产 634.3 千克，比对照增产 0.9%。2019 年生产试验，平均亩产 588.2 千克，比对照增产 3.8%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8-10 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200041

品种名称：隆优 2129

申 请 者：湖南隆平高科种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆香 634A×华恢 2129

特征特性：籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 113.0 天，比对照天优华占短 6.1 天。株高 105.5 厘米，亩有效穗 23.1 万穗，每穗总粒数 161.5 粒，结实率 78.5%，千粒重 22.8 克。抗性：叶瘟 2.8 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 81.1%，精米率 71.7%，整精米率 62.6%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 18%，垩白度 5.6%，透明度 2 级，碱消值 3.3 级，胶稠度 90 毫米，直链淀粉含量 14.7%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 605.1 千克，比对照增产 1.1%; 2019 年续试，平均亩产 617.5 千克，比对照减产 1.9%; 两年区域试验平均亩产 611.3 千克，比对照减产 0.4%。2019 年生产试验，平均亩产 572.5 千克，比对照增产 1.0%。

栽培技术要点：湘北 6 月 18 日前播种，湘中南 6 月 20-23 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200042

品种名称：五优 3636

申 请 者：湖南恒德种业科技有限公司

育 种 者：湖南恒德种业科技有限公司、湖南神州星锐种业科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源：五丰 A×P36

特征特性：籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 115.5 天，比对照天优华占短 3.3 天。株高 108.2 厘米，亩有效穗 22.4 万穗，每穗总粒数 153.6 粒，结实率 85.3%，千粒重 22.9 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 3.3 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 79.7%，精米率 69.9%，整精米率 59.3%，粒长 5.8 毫米，长宽比 2.7，垩白粒率 28%，垩白度 9.8%，透明度 1 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 77 毫米，直链淀粉含量 13.8%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 634.4 千克，比对照增产 1.7%; 2019 年续试，平均亩产 638.0 千克，比对照增产 1.4%; 两年区域试验平均亩产 636.2 千克，比对照增产 1.6%。2019 年生产试验，平均亩产 594.3 千克，比对照增产 4.9%。

栽培技术要点：6 月 20 日左右播种，秧田亩播种量为 8-10 公斤，大田亩用种量 1.2-1.5 公斤，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200043

品种名称：隆晶优 4171

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆晶 4302A×华恢 4171

特征特性：籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 119.1 天，比对照天优华占长 0.2 天。株高 109.5 厘米，亩有效穗 21.8 万穗，每穗总粒数 150.4 粒，结实率 82.8%，千粒重 25.2 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 3.4 级，穗瘟损失率 1.7 级，稻瘟病综合抗性指数 2.4，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.4%，精米率 71.9%，整精米率 62.7%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 10%，垩白度 3.1%，透明度 2 级，碱消值 5.3 级，胶稠度 86 毫米，直链淀粉含量 15.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 633.2 千克，比对照增产 1.5%; 2019 年续试，平均亩产 644.4 千克，比对照增产 3.4%; 两年区域试验平均亩产 638.8 千克，比对照增产 2.5%。2019 年生产试验，平均亩产 601.5 千克，比对照增产 6.1%。

栽培技术要点：湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，坚持强氯精浸种，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200044

品种名称：陵两优 1309

申 请 者：湖南佳和种业股份有限公司

育 种 者：湖南佳和种业股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：湘陵 628S×R1309

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 109.4 天，比对照株两优 819 长 0.1 天。株高 95.1 厘米，亩有效穗 21.2 万穗，每穗总粒数 121.3 粒，结实率 82.9%，千粒重 25.9 克。抗性：叶瘟 5.9 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 5.0 级，稻瘟病综合抗性指数 5.9，白叶枯病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 78.0%，精米率 65.9%，整精米率 58.7%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.0，垩白粒率 35%，垩白度 14.4%，透明度 2 级，碱消值 4.5 级，胶稠度 87 毫米，直链淀粉含量 12.2%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产 537.1 千克，比对照增产 3.2%；2019 年续试，平均亩产 470.1 千克，比对照增产 3.0%；两年区域试验平均亩产 503.6 千克，比对照增产 3.1%。2019 年生产试验，平均亩产 489.9 千克，比对照增产 4.8%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 15 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 35 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 9 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200045

品种名称：浙两优 166

申 请 者：湖南佳和种业股份有限公司

育 种 者：湖南佳和种业股份有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所

品种来源：浙 397S×Z16-6

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 111.4 天，比对照株两优 819 长 2.1 天。株高 99.4 厘米，亩有效穗 19.1 万穗，每穗总粒数 146.2 粒，结实率 80.2%，千粒重 25.8 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 7.0 级。米质：糙米率 77.7%，精米率 63.3%，整精米率 49.4%，粒长 5.8 毫米，长宽比 2.4，垩白粒率 90%，垩白度 25.4%，透明度 2 级，碱消值 3.0 级，胶稠度 30 毫米，直链淀粉含量 22.9%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产 546.4 千克，比对照增产 5.0%；2019 年续试，平均亩产 478.3 千克，比对照增产 4.9%；两年区域试验平均亩产 512.4 千克，比对照增产 5.0%。2019 年生产试验，平均亩产 497.2 千克，比对照增产 6.4%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 15 千克，大田亩用种量 2.0-2.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25-30 天。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥早，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不过早脱水。及时防治二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200046

品种名称：康两优 911

申 请 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

育 种 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

品种来源：康 58S×创恢 911

特征特性：籼型两系杂交中稻中熟品种。在湖南省作中熟中稻栽培，全生育期 125.0 天，比对照天优华占长 0.5 天。株高 112.5 厘米，亩有效穗 16.0 万穗，每穗总粒数 210.2 粒，结实率 85.1%，千粒重 24.1 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 79.1%，精米率 67.7%，整精米率 59.6%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 27%，垩白度 8.5%，透明度 1 级，碱消值 3.0 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 12.0%。

产量表现：2017 年参加湖南省潇湘联合体中稻中熟组区域试验，平均亩产 596.8 千克，比对照增产 10.3%；2018 年续试，平均亩产 681.7 千克，比对照增产 5.1%；两年区域试验平均亩产 639.3 千克，比对照增产 7.7%。2018 年生产试验，平均亩产 634.3 千克，比对照增产 20.8%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足、追肥速、中期补，基蘖肥与穗肥比例 6:4 或 7:3，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200047

品种名称：吨两优 17

申 请 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

育 种 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

品种来源：吨 S×创恢 17

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 130.0 天，比对照 Y 两优 1 号短 3.9 天。株高 115.5 厘米，亩有效穗 16.3 万穗，每穗总粒数 195.1 粒，结实率 86.7%，千粒重 26.4 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 78.1%，精米率 68.0%，整精米率 64.3%，粒长 6.1 毫米，长宽比 2.9，垩白粒率 24%，垩白度 7.8%，透明度 2 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 12.6%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 688.2 千克，比对照增产 5.3%；2019 年续试，平均亩产 633.4 千克，比对照增产 5.8%；两年区域试验平均亩产 660.8 千克，比对照增产 5.6%。2019 年生产试验，平均亩产 614.9 千克，比对照增产 5.0%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200048

品种名称：利两优华晶

申 请 者：湖南垦惠商业化育种有限责任公司

育 种 者：湖南垦惠商业化育种有限责任公司、长沙利诚种业有限公司

品种来源：利 S×惠恢 851

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 131.0 天，比对照 Y 两优 1 号短 3.0 天。株高 120.0 厘米，亩有效穗 16.3 万穗，每穗总粒数 200.6 粒，结实率 85.7%，千粒重 23.8 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.4%，精米率 69.8%，整精米率 59.0%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.0，垩白粒率 56%，垩白度 21.0%，透明度 2 级，碱消值 3.8 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 15.8%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 673.0 千克，比对照增产 4.1%; 2019 年续试，平均亩产 605.5 千克，比对照增产 1.2%; 两年区域试验平均亩产 639.3 千克，比对照增产 2.7%。2019 年生产试验，平均亩产 591.6 千克，比对照增产 1.8%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200049

品种名称：望两优 815

申 请 者：湖南湘穗种业有限责任公司

育 种 者：湖南湘穗种业有限责任公司

品种来源：望 S×R815

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 130.7 天，比对照 Y 两优 1 号短 3.2 天。株高 111.6 厘米，亩有效穗 16.0 万穗，每穗总粒数 192.0 粒，结实率 87.6%，千粒重 26.0 克。抗性：叶瘟 5.7 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.7 级，稻瘟病综合抗性指数 5.6，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.9 级。米质主要指标：糙米率 79.2%，精米率 68.1%，整精米率 51.6%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 38%，垩白度 11.9%，透明度 1 级，碱消值 4.5 级，胶稠度 87 毫米，直链淀粉含量 12.3%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 666.0 千克，比对照增产 1.9%；2019 年续试，平均亩产 633.3 千克，比对照增产 5.8%；两年区域试验平均亩产 649.7 千克，比对照增产 3.9%。2019 年生产试验，平均亩产 603.9 千克，比对照增产 3.4%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 7 千克，大田亩用种量 1.25-1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200050

品种名称：圳两优 2018

申 请 者：长沙利诚种业有限公司

育 种 者：长沙利诚种业有限公司

品种来源：圳 S×R2018

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 132.0 天，比对照 Y 两优 1 号短 2.0 天。株高 119.0 厘米，亩有效穗 17.2 万穗，每穗总粒数 189.6 粒，结实率 87.5%，千粒重 24.4 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.0，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 77.0%，精米率 64.2%，整精米率 59.6%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 11%，垩白度 3.6%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 73 毫米，直链淀粉含量 13.3%，稻米蒸煮食用感官评价 75.3 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 664.7 千克，比对照增产 2.8%；2019 年续试，平均亩产 626.7 千克，比对照增产 4.7%；两年区域试验平均亩产 645.7 千克，比对照增产 3.8%。2019 年生产试验，平均亩产 607.9 千克，比对照增产 4.0%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200051

品种名称：汉两优 1607

申 请 者：湖南佳和种业股份有限公司

育 种 者：湖南佳和种业股份有限公司

品种来源：汉 S×R1607

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 120.5 天，比对照 C 两优 343 短 1.9 天。株高 113.6 厘米，亩有效穗 18.8 万穗，每穗总粒数 190.4 粒，结实率 80.5%，千粒重 23.5 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.4，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.0%，精米率 71.9%，整精米率 53.4%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 18%，垩白度 4.2%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 14.2%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 646.0 千克，比对照增产 3.0%；2019 年续试，平均亩产 617.5 千克，比对照增产 4.7%；两年区域试验平均亩产 631.8 千克，比对照增产 3.9%。2019 年生产试验，平均亩产 575.4 千克，比对照增产 1.9%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200052

品种名称：韶优 766

申 请 者：湖南佳和种业股份有限公司

育 种 者：湖南佳和种业股份有限公司、韶关市农业科技推广中心、广东源泰农业科技有限公司

品种来源：韶农 A×泰恢 766

特征特性：籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.8 天，比对照 C 两优 343 短 4.4 天。株高 118.7 厘米，亩有效穗 18.8 万穗，每穗总粒数 203.3 粒，结实率 79.5%，千粒重 22.1 克。抗性：叶瘟 4.5 级，穗瘟 6.4 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 82.2%，精米率 73.8%，整精米率 66.9%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 8%，垩白度 2.0%，透明度 1 级，碱消值 6.8 级，胶稠度 86 毫米，直链淀粉含量 17.5%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 621.3 千克，比对照增产 1.3%；2019 年续试，平均亩产 592.4 千克，比对照增产 0.4%；两年区域试验平均亩产 606.9 千克，比对照增产 0.9%。2019 年生产试验，平均亩产 571.1 千克，比对照增产 1.2%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200053

品种名称：旺两优 911

申 请 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

育 种 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

品种来源：W115S×创恢 911

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 114.3 天，比对照岳优 9113 长 0.3 天。株高 104.1 厘米，亩有效穗 19.6 万穗，每穗总粒数 183.5 粒，结实率 77.5%，千粒重 23.9 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 78.6%，精米率 72.0%，整精米率 67.7%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 6.5%，垩白度 1.1%，透明度 1 级，碱消值 6.1 级，胶稠度 56 毫米，直链淀粉含量 19.1%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 619.6 千克，比对照增产 6.3%; 2019 年续试，平均亩产 604.0 千克，比对照增产 5.8%; 两年区域试验平均亩产 611.8 千克，比对照增产 6.1%。2019 年生产试验，平均亩产 547.9 千克，比对照增产 5.0%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 20 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮，磷，钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200054

品种名称：深优 610

申 请 者：湖南佳和种业股份有限公司

育 种 者：湖南佳和种业股份有限公司、国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所

品种来源：深 95A×R610

特征特性：籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 113.2 天，比对照岳优 9113 短 0.1 天。株高 106.8 厘米，亩有效穗 20.5 万穗，每穗总粒数 155.2 粒，结实率 82.2%，千粒重 25.0 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.9%，精米率 73.8%，整精米率 68.0%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 19%，垩白度 4.6%，透明度 2 级，碱消值 3.0 级，胶稠度 89 毫米，直链淀粉含量 14.6%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 589.9 千克，比对照增产 2.9%; 2019 年续试，平均亩产 597.1 千克，比对照增产 5.6%; 两年区域试验平均亩产 593.5 千克，比对照增产 4.3%。2019 年生产试验，平均亩产 554.2 千克，比对照增产 6.2%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10-12 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200055

品种名称：吉优粤占

申 请 者：益阳市惠民种业科技有限公司

育 种 者：益阳市惠民种业科技有限公司、湖南永益农业科技发展有限公司、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源：吉丰 A×粤占

特征特性：籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 114.2 天，比对照岳优 9113 长 1.0 天。株高 100.4 厘米，亩有效穗 21.7 万穗，每穗总粒数 150.3 粒，结实率 82.6%，千粒重 24.8 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 82.2%，精米率 73.6%，整精米率 68.5%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 13.5%，垩白度 3.4%，透明度 2 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 55 毫米，直链淀粉含量 21.2%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 600.6 千克，比对照增产 4.8%；2019 年续试，平均亩产 588.4 千克，比对照增产 4.1%；两年区域试验平均亩产 594.5 千克，比对照增产 4.5%。2019 年生产试验，平均亩产 550.8 千克，比对照增产 5.6%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10-12 千克，大田亩用种量 1.5 千克左右，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200056

品种名称：吉优晶占

申 请 者：湖南永益农业科技发展有限公司

育 种 者：湖南永益农业科技发展有限公司、浙江科诚种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南生物机电职业技术学院

品种来源：吉丰 A×晶占

特征特性：籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 115.6 天，比对照岳优 9113 长 1.6 天。株高 104.0 厘米，亩有效穗 21.0 万穗，每穗总粒数 146.5 粒，结实率 79.5%，千粒重 25.5 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 81.2%，精米率 71.3%，整精米率 62.2%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 17%，垩白度 3.3%，透明度 1 级，碱消值 5.3 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 21.3%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 600.0 千克，比对照增产 3.0%; 2019 年续试，平均亩产 591.4 千克，比对照增产 3.6%; 两年区域试验平均亩产 595.7 千克，比对照增产 3.3%。2019 年生产试验，平均亩产 548.2 千克，比对照增产 5.1%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10-12 千克，大田亩用种量 1.5 千克左右，浸种时用强氯精消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200057

品种名称：创优华九

申 请 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

育 种 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

品种来源：创 3A×创恢华九

特征特性：籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 117.1 天，比对照天优华占短 1.3 天。株高 114.4 厘米，亩有效穗 22.7 万穗，每穗总粒数 159.5 粒，结实率 80.5%，千粒重 24.0 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 82.2%，精米率 72.8%，整精米率 65.2%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 30.5%，垩白度 8.4%，透明度 2 级，碱消值 5.4 级，胶稠度 54 毫米，直链淀粉含量 22.1%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 625.0 千克，比对照增产 1.1%; 2019 年续试，平均亩产 645.8 千克，比对照增产 3.9%; 两年区域试验平均亩产 635.4 千克，比对照增产 2.5%。2019 年生产试验，平均亩产 620.9 千克，比对照增产 5.7%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 20 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200058

品种名称：旺两优 98 丝苗

申 请 者：湖南袁创超级稻技术有限公司

育 种 者：湖南袁创超级稻技术有限公司、广东省农业科学院植物保护研究所

品种来源：W115S×粤恢 98 丝苗

特征特性：籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 115.2 天，比对照天优华占短 3.2 天。株高 113.5 厘米，亩有效穗 22.0 万穗，每穗总粒数 160.1 粒，结实率 83.9%，千粒重 23.3 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 3.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 72.6%，整精米率 69.5%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 6.5%，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 64 毫米，直链淀粉含量 18.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 638.4 千克，比对照增产 3.3%; 2019 年续试，平均亩产 629.3 千克，比对照增产 3.5%; 两年区域试验平均亩产 633.9 千克，比对照增产 3.4%。2019 年生产试验，平均亩产 610.6 千克，比对照增产 3.9%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 20 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20200059

品种名称：板仓早糯

申 请 者：湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南省水稻研究所

品种来源：香糯 110×云大粒

特征特性：籼型常规早稻中熟糯米品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期113.7天，比对照株两优819长3.0天。株高87.0厘米，亩有效穗19.5万穗，每穗总粒数96.5粒，结实率78.2%，千粒重31.0克。抗性：叶瘟5.3级，穗瘟7.0级，穗瘟损失率5.0级，稻瘟病综合抗性指数5.6，白叶枯病5.0级。米质主要指标：糙米率76.0%，精米率58.2%，整精米率48.0%，粒长6.1毫米，长宽比2.6，碱消值4.5级，胶稠度86毫米，直链淀粉含量1.5%。

产量表现：2018 年参加湖南省水稻联合品比早稻中熟组试验，平均亩产 429.5 千克，比对照减产 17.0%；2019 年续试，平均亩产 393.8 千克，比对照减产 14.3%；两年联合品比试验平均亩产 411.7 千克，比对照减产 15.7%。2019 年生产试验，平均亩产 427.4 千克，比对照减产 5.0%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 20 千克，大田亩用种量 4.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 10-12 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种作为特种稻审定。可在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200060

品种名称：板仓早紫

申 请 者：湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南省水稻研究所

品种来源：早籼黑宝×丰优早 11 号

特征特性：籼型常规早稻中熟紫米品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 111.1 天，比对照株两优 819 长 0.9 天。株高 91.0 厘米，亩有效穗 19.2 万穗，每穗总粒数 110.2 粒，结实率 78.8%，千粒重 26.0 克。抗性：叶瘟 6.0 级，穗瘟 7.0 级，穗瘟损失率 5.7 级，稻瘟病综合抗性指数 6.1，白叶枯病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 68.7%，整精米率 47.8%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 59%，垩白度 10.2%，透明度 2 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 9.7%。

产量表现：2018 年参加湖南省水稻联合品比早稻中熟组试验，平均亩产 482.9 千克，比对照减产 5.7%；2019 年续试，平均亩产 403.0 千克，比对照减产 12.3%；两年联合品比试验平均亩产 443.0 千克，比对照减产 9.0%。2019 年生产试验，平均亩产 439.4 千克，比对照减产 6.5%。

栽培技术要点：3 月下旬播种，秧田亩播种量 20 千克，大田亩用种量 4.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 10-12 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种作为特种稻审定。可在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20200061

品种名称：板仓全彩

申 请 者：湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南省水稻研究所

品种来源：全紫稻×湘晚籼 13 号

特征特性：籼型常规中稻中熟黑米品种。在湖南省作中熟中稻栽培，全生育期125.8天，与对照天优华占相当。株高135.0厘米，亩有效穗12.9万穗，每穗总粒数219.6粒，结实率73.7%，千粒重26.0克。抗性：叶瘟6.0级，穗瘟6.3级，穗瘟损失率3.7级，稻瘟病综合抗性指数4.9，白叶枯病5.0级，稻曲病5.0级。米质主要指标：糙米率76.3%，精米率64.3%，整精米率53.1%，粒长6.4毫米，长宽比3.1，垩白粒率42%，垩白度12.7%，碱消值4.5级，胶稠度80毫米，直链淀粉含量16.3%。

产量表现：2018 年参加湖南省水稻联合品比中稻中熟组试验，平均亩产 550.3 千克，比对照减产 0.7%；2019 年续试，平均亩产 371.8 千克，比对照减产 38.6%；两年联合品比试验平均亩产 461.1 千克，比对照减产 19.7%。2019 年生产试验，平均亩产 537.5 千克，比对照减产 8.7%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 12 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 公斤，浸种时用强氯精消毒，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种作为特种稻审定。可在湖南省稻瘟病轻发区作中熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200062

品种名称：板仓红糯

申 请 者：湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南省水稻研究所

品种来源：糯 110×湘晚籼 12 号

特征特性：籼型常规中稻中熟红糯米品种。在湖南省作中熟中稻栽培，全生育期 121.0 天，比对照天优华占短 0.5 天。株高 113.0 厘米，亩有效穗 20.8 万穗，每穗总粒数 110.0 粒，结实率 85.1%，千粒重 26.0 克。抗性：叶瘟 6.0 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 66.3%，整精米率 52.8%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.4，碱消值 6.5 级，胶稠度 100 毫米，直链淀粉含量 1.2%。

产量表现：2018 年参加湖南省水稻联合品比中稻中熟组试验，平均亩产 558.6 千克，比对照减产 8.8%；2019 年续试，平均亩产 511.1 千克，比对照减产 11.0%；两年联合品比试验平均亩产 534.9 千克，比对照减产 9.9%。2019 年生产试验，平均亩产 569.8 千克，比对照减产 3.6%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 12 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 公斤，浸种时用强氯精消毒，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种作为特种稻审定。可在湖南省稻瘟病轻发区作中熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20200063

品种名称：湘糯 28

申 请 者：湖南湘穗种业有限责任公司

育 种 者：湖南湘穗种业有限责任公司

品种来源：湘晚糯 1 号×鄂荆糯 6 号

特征特性：籼型常规一季稻糯米品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 125.3 天，比对照 C 两优 343 短 0.5 天。株高 118.6 厘米，亩有效穗 19.0 万穗，每穗总粒数 146.3 粒，结实率 81.5%，千粒重 26.0 克。抗性：叶瘟 4.7 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 4.3 级，稻瘟病综合抗性指数 4.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 75.4%，精米率 68.8%，整精米率 55.0%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.3，碱消值 6.0 级，胶稠度 95 毫米，直链淀粉含量 1.2%。

产量表现：2017 年参加湖南省潇湘联合体迟熟二组区域试验，平均亩产 545.0 千克，比对照减产 2.0%；2018 年参加湖南省联合品比中稻迟熟二组试验，平均亩产 573.2 千克，比对照减产 10.4%；两年试验平均亩产 559.1 千克，比对照减产 6.2%。2018 年生产试验，平均亩产 554.5 千克，比对照减产 4.7%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 2.0-2.5 千克，浸种时药剂消毒，稀播、匀播培育壮秧，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 10 万左右。基肥足，追肥速，有机肥与氮、磷、钾配合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种作为特种稻审定。可在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20200064

品种名称：赞两优 13

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、东莞市中堂凤冲水稻科研站、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：赞 6158S×GR13

特征特性：籼型两系杂交晚稻迟熟红米品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期120.3天，比对照天优华占长1.2天。株高137.8厘米，亩有效穗21.2万穗，每穗总粒数197.4粒，结实率81.3%，千粒重24.1克。抗性：叶瘟2.5级，穗瘟4.5级，穗瘟损失率2.5级，稻瘟病综合抗性指数3.0，白叶枯病5.0级，稻曲病5.0级。米质主要指标：糙米率79.8%，精米率71.0%，整精米率59.0%，粒长6.6毫米，长宽比3.5，垩白粒率10.5%，垩白度2.4%，透明度2级，碱消值5.0级，胶稠度72毫米，直链淀粉含量17.9%。

产量表现：2018 年参加湖南省水稻联合品比晚稻迟熟组试验，平均亩产 596.1 千克，比对照减产 0.7%；2019 年续试，平均亩产 590.2 千克，比对照减产 6.7%；两年联合品比试验平均亩产 593.2 千克，比对照减产 3.7%。2019 年生产试验，平均亩产 558.1 千克，比对照减产 1.5%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0-1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种作为特种稻审定。可在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20206001

品种名称：珂两优 1273

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华珂 226S×华恢 1273

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 135.0 天，比对照 Y 两优 1 号长 1.1 天。株高 121.3 厘米，亩有效穗 16.0 万穗，每穗总粒数 196.6 粒，结实率 85.5%，千粒重 26.8 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 81.4%，精米率 72.9%，整精米率 68.9%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 17%，垩白度 3.5%，透明度 1 级，碱消值 4.8 级，胶稠度 40 毫米，直链淀粉含量 22.3%。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区试，平均亩产 663.4 千克，比对照增产 11.1%；2019 年续试，平均亩产 651.4 千克，比对照增产 6.6%；两年区试平均亩产 657.4 千克，比对照增产 8.9%。2019 年生产试验，平均亩产 616.8 千克，比对照增产 6.5%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 11.5 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206002

品种名称： 隆 8 优 5438

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆 8A×华恢 5438

特征特性： 籼型三系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 129.0 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.0 天。株高 113.9 厘米，亩有效穗 16.2 万穗，每穗总粒数 207.6 粒，结实率 85.9%，千粒重 25.4 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.5%，精米率 71.3%，整精米率 62.6%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 17%，垩白度 4.6%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 15.3%。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 663.7 千克，比对照增产 11.2%；2019 年续试，平均亩产 643.8 千克，比对照增产 5.3%；两年区域试验平均亩产 653.8 千克，比对照增产 8.3%。2019 年生产试验，平均亩产 613.9 千克，比对照增产 6.0%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。搞好水分管理，够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时施药防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20206003

品种名称：捷两优 7810

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华捷 221S×华恢 7810

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 128.7 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.3 天。株高 112.2 厘米，亩有效穗 15.4 万穗，每穗总粒数 199.9 粒，结实率 84.9%，千粒重 25.8 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 81.6%，精米率 68.5%，整精米率 52.0%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 35%，垩白度 7.5%，透明度 2 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 86 毫米，直链淀粉含量 15.1%。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 618.2 千克，比对照增产 3.5%；2019 年续试，平均亩产 633.9 千克，比对照增产 3.7%；两年区域试验平均亩产 626.1 千克，比对照增产 3.6%。2019 年生产试验，平均亩产 604.4 千克，比对照增产 4.3%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。搞好水分管理，够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时施药防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20206004

品种名称：捷两优 8612

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华捷 221S×华恢 8612

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 128.3 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.7 天。株高 115.0 厘米，每穗总粒数 206.8 粒，结实率 85.8%，千粒重 26.2 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.0，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 82.8%，精米率 70.5%，整精米率 51.1%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 19%，垩白度 4.8%，透明度 2 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 85 毫米，直链淀粉含量 15.3%。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 662.4 千克，比对照增产 10.9%；2019 年续试，平均亩产 644.2 千克，比对照增产 5.4%；两年区域试验平均亩产 653.3 千克，比对照增产 8.2%。2019 年生产试验，平均亩产 606.5 千克，比对照增产 4.7%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206005

品种名称： 莉晶优 4945

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 莉晶 A×R4945

特征特性： 籼型三系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 128.1 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.9 天。株高 106.9 厘米，亩有效穗 16.1 万穗，每穗总粒数 207.2 粒，结实率 84.5%，千粒重 22.6 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 6.4 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 82.2%，精米率 65.8%，整精米率 54.2%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 19%，垩白度 5.0%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 89 毫米，直链淀粉含量 14.1%，稻米蒸煮食用感官评价 84.2 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 600.1 千克，比对照增产 0.5%；2019 年续试，平均亩产 635.0 千克，比对照增产 3.9%；两年区域试验平均亩产 617.6 千克，比对照增产 2.2%。2019 年生产试验，平均亩产 604.3 千克，比对照增产 4.1%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206006

品种名称： 俊两优黄莉占

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南兴隆种业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司

品种来源： 俊 S×黄莉占

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 128.9 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.1 天。株高 111.7 厘米，亩有效穗 16.1 万穗，每穗总粒数 186.9 粒，结实率 86.3%，千粒重 24.2 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 80.2%，精米率 70.8%，整精米率 62.2%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 12%，垩白度 2.1%，透明度 2 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 89 毫米，直链淀粉含量 14.8%，稻米蒸煮食用感官评价 75.4 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 579.3 千克，比对照减产 3.0%；2019 年续试，平均亩产 585.2 千克，比对照减产 4.3%；两年区域试验平均亩产 582.3 千克，比对照减产 3.7%。2019 年生产试验，平均亩产 598.5 千克，比对照增产 3.1%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206007

品种名称： 平两优丝苗

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南兴隆种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司

品种来源： 平 S×五山丝苗

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 136.1 天，比对照 Y 两优 1 号长 2.2 天。株高 121.0 厘米，亩有效穗 16.5 万穗，每穗总粒数 188.6 粒，结实率 83.3%，千粒重 25.1 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 4.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 80.6%，精米率 71.3%，整精米率 68.4%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 13%，垩白度 3.0%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.1%，稻米蒸煮食用感官评价 76.8 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 666.7 千克，比对照增产 6.5%；2019 年续试，平均亩产 634.4 千克，比对照增产 5.4%；两年区域试验平均亩产 650.6 千克，比对照增产 6.0%。2019 年生产试验，平均亩产 614.9 千克，比对照增产 3.7%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206008

品种名称： 隆 8 优 1308

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆 8A×华恢 1308

特征特性： 籼型三系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 130.2 天，比对照 Y 两优 1 号短 3.7 天。株高 121.3 厘米，亩有效穗 14.5 万穗，每穗总粒数 204.1 粒，结实率 82.7%，千粒重 27.5 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 6 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 81.6%，精米率 68.9%，整精米率 54.4%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 12%，垩白度 3.5%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 79 毫米，直链淀粉含量 15.7%，稻米蒸煮食用感官评价 77.2 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 653.0 千克，比对照增产 4.3%；2019 年续试，平均亩产 640.6 千克，比对照增产 6.4%；两年区域试验平均亩产 646.8 千克，比对照增产 5.4%。2019 年生产试验，平均亩产 630.5 千克，比对照增产 6.3%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克。重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20206009

品种名称：隆两优 3817

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆科 638S×华恢 3817

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 134.5 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.6 天。株高 124.8 厘米，亩有效穗 15.0 万穗，每穗总粒数 193.2 粒，结实率 86.5%，千粒重 27.1 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 79.8%，精米率 69.7%，整精米率 63.7%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 13%，垩白度 3.2%，透明度 2 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 13.5%。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 686.5 千克，比对照增产 9.7%；2019 年续试，平均亩产 646.8 千克，比对照增产 7.4%；两年区域试验平均亩产 666.7 千克，比对照增产 8.6%。2019 年生产试验，平均亩产 640.3 千克，比对照增产 8.0%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 11.5 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20206010

品种名称：臻两优 3703

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆臻 36S×华恢 3703

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 134.6 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.7 天。株高 125.0 厘米，亩有效穗 14.4 万穗，每穗总粒数 197.3 粒，结实率 83.9%，千粒重 24.1 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 3.4 级，穗瘟损失率 1.4 级，稻瘟病综合抗性指数 2.3，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.1%，精米率 71.5%，整精米率 60.1%，粒长 6.7 毫米，长宽比 2.9，垩白粒率 18%，垩白度 3.4%，透明度 2 级，碱消值 3.3 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 14.5%。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 665.4 千克，比对照增产 6.3%；2019 年续试，平均亩产 635.9 千克，比对照增产 5.6%；两年区域试验平均亩产 650.7 千克，比对照增产 6.0%。2019 年生产试验，平均亩产 620.6 千克，比对照增产 4.7%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 11.5 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克。重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206011

品种名称： 靓两优丝苗

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司

品种来源： 靓 S×五山丝苗

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 128.2 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.8 天。株高 108.8 厘米，亩有效穗 16.6 万穗，每穗总粒数 155.9 粒，结实率 91.6%，千粒重 24.9 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 6.4 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 80.6%，精米率 70.6%，整精米率 65.2%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 10%，垩白度 2.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 79 毫米，直链淀粉含量 15.1%，稻米蒸煮食用感官评价 76.0 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟组区域试验，平均亩产 626.1 千克，与对照相当；2019 年续试，平均亩产 624.9 千克，比对照增产 3.8%；两年区域试验平均亩产 625.5 千克，比对照增产 1.9%。2019 年生产试验，平均亩产 615.7 千克，比对照增产 6.1%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206012

品种名称： 韵两优 5438

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 韵 2013S×华恢 5438

特征特性： 籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 119.1 天，比对照 C 两优 343 短 1.9 天。株高 115.3 厘米，亩有效穗 17.7 万穗，每穗总粒数 198.7 粒，结实率 85.4%，千粒重 24.0 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.0，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.3%，精米率 72.0%，整精米率 52.0%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 26%，垩白度 4.0%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 13.5%，稻米蒸煮食用感官评价 82.6 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 655.0 千克，比对照增产 5.1%；2019 年续试，平均亩产 663.3 千克，比对照增产 6.5%；两年区域试验平均亩产 659.2 千克，比对照增产 5.8%。2019 年生产试验，平均亩产 604.3 千克，比对照增产 5.5%。

栽培技术要点： 5 月底 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、稻瘟病、稻曲病、纹枯病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206013

品种名称： 韵两优 1308

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 韵 2013S×华恢 1308

特征特性： 籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 119.4 天，比对照 C 两优 343 短 2.1 天。株高 116.1 厘米，亩有效穗 16.6 万穗，每穗总粒数 192.7 粒，结实率 88.1%，千粒重 25.3 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.3%，精米率 71.6%，整精米率 62.9%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 11%，垩白度 2.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 14.8%，稻米蒸煮食用感官评价 83.3 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 641.1 千克，比对照增产 1.2%；2019 年续试，平均亩产 622.1 千克，比对照减产 0.1%；两年区域试验平均亩产 631.6 千克，比对照增产 0.6%。2019 年生产试验，平均亩产 595.6 千克，比对照增产 4.0%。

栽培技术要点： 5 月底 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20206014

品种名称：D 两优 8146

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：D080S×华恢 8146

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 121.8 天，比对照 C 两优 343 长 0.4 天。株高 121.1 厘米，亩有效穗 17.2 万穗，每穗总粒数 184.2 粒，结实率 79.6%，千粒重 25.3 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.0，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 70.7%，整精米率 55.0%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 13%，垩白度 2.5%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 62 毫米，直链淀粉含量 16.4%，稻米蒸煮食用感官评价 84.5 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 626.1 千克，比对照增产 0.7%；2019 年续试，平均亩产 634.6 千克，比对照增产 1.9%；两年区域试验平均亩产 630.4 千克，比对照增产 1.3%。2019 年生产试验，平均亩产 577.7 千克，比对照增产 0.8%。

栽培技术要点：5 月下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206015

品种名称： 玮两优 8612

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 华玮 338S×华恢 8612

特征特性： 籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.8 天，比对照 C 两优 343 长 2.4 天。株高 119.9 厘米，亩有效穗 16.0 万穗，每穗总粒数 209.3 粒，结实率 83.2%，千粒重 25.7 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 78.9%，精米率 71.9%，整精米率 65.4%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 8%，垩白度 1.2%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 55 毫米，直链淀粉含量 16.8%。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 658.2 千克，比对照增产 3.9%；2019 年续试，平均亩产 655.0 千克，比对照增产 5.2%；两年区域试验平均亩产 656.6 千克，比对照增产 4.6%。2019 年生产试验，平均亩产 599.5 千克，比对照增产 4.7%。

栽培技术要点： 5 月底 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 11.5 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20206016

品种名称：玮两优 1206

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华玮 338S×R1206

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 122.6 天，比对照 C 两优 343 长 1.4 天。株高 118.8 厘米，亩有效穗 16.6 万穗，每穗总粒数 185.6 粒，结实率 85.2%，千粒重 25.6 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 81.2%，精米率 70.2%，整精米率 59.0%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 8%，垩白度 2.0%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 85 毫米，直链淀粉含量 14.6%，稻米蒸煮食用感官评价 82.0 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 633.8 千克，比对照增产 3.9%；2019 年续试，平均亩产 637.3 千克，比对照增产 2.3%；两年区域试验平均亩产 635.6 千克，比对照增产 3.1%。2019 年生产试验，平均亩产 623.7 千克，比对照增产 6.6%。

栽培技术要点：5 月底 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 11.5 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20206017

品种名称：珂两优 8612

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华珂 226S×华恢 8612

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 125.3 天，比对照 C 两优 343 长 4.6 天。株高 115.5 厘米，亩有效穗 16.5 万穗，每穗总粒数 206.7 粒，结实率 79.3%，千粒重 25.6 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 2.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 80.9%，精米率 69.7%，整精米率 56.8%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 20%，垩白度 4%，透明度 1 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 20.1%。

产量表现：2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 644.8 千克，比对照增产 2.2%；2019 年续试，平均亩产 635.1 千克，比对照增产 5.1%；两年区域试验平均亩产 640.0 千克，比对照增产 3.7%。2019 年生产试验，平均亩产 605.8 千克，比对照增产 6.2%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 11.5 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206018

品种名称： 隆晶优蒂占

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×蒂占

特征特性： 籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 118.8 天，比对照 C 两优 343 短 2.0 天。株高 110.1 厘米，亩有效穗 17.4 万穗，每穗总粒数 178.9 粒，结实率 86.2%，千粒重 25.0 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 73.2%，整精米率 62.6%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 3%，垩白度 0.6%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.4%。在 2018 年湖南省第十二次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 624.3 千克，比对照减产 1.0%；2019 年续试，平均亩产 581.0 千克，比对照减产 3.8%；两年区域试验平均亩产 602.7 千克，比对照减产 2.4%。2019 年生产试验，平均亩产 564.3 千克，比对照减产 1.1%。

栽培技术要点： 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206019

品种名称： 增两优黄莉占

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司

品种来源： 增 S×黄莉占

特征特性： 籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.5 天，比对照 C 两优 343 短 4.8 天。株高 111.8 厘米，亩有效穗 18.7 万穗，每穗总粒数 190.6 粒，结实率 79.6%，千粒重 23.1 克。抗性：叶瘟 4.3 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 70.1%，整精米率 60.6%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 14%，垩白度 2.9%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.3%，稻米蒸煮食用感官评价 81.3 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 622.9 千克，比对照增产 0.1%；2019 年续试，平均亩产 583.8 千克，比对照减产 3.4%；两年区域试验平均亩产 603.4 千克，比对照减产 1.7%。2019 年生产试验，平均亩产 555.7 千克，比对照减产 2.6%。

栽培技术要点： 5 月下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206020

品种名称： 隆晶优 5438

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×华恢 5438

特征特性： 籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.4 天，比对照 C 两优 343 短 3.6 天。株高 113.7 厘米，亩有效穗 15.8 万穗，每穗总粒数 208.5 粒，结实率 84.2%，千粒重 25.8 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.8%，精米率 71.8%，整精米率 59.5%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 17%，垩白度 3.6%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 65 毫米，直链淀粉含量 16.0%。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 625.5 千克，比对照增产 3.0%；2019 年续试，平均亩产 615.2 千克，比对照增产 0.8%；两年区域试验平均亩产 620.4 千克，比对照增产 1.9%。2019 年生产试验，平均亩产 596.1 千克，比对照增产 3.4%。

栽培技术要点： 5 月底 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206021

品种名称： 隆晶优 1273

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×华恢 1273

特征特性： 籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 118.3 天，比对照 C 两优 343 短 2.7 天。株高 112.2 厘米，亩有效穗 17.8 万穗，每穗总粒数 166.2 粒，结实率 86.5%，千粒重 27.0 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.0，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 68.6%，整精米率 52.0%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 15%，垩白度 3.6%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 69 毫米，直链淀粉含量 16.5%，稻米蒸煮食用感官评价 82.0 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 627.9 千克，比对照增产 3.4%；2019 年续试，平均亩产 586.9 千克，比对照减产 3.8%；两年区域试验平均亩产 607.4 千克，比对照减产 0.2%。2019 年生产试验，平均亩产 563.1 千克，比对照减产 2.3%。

栽培技术要点： 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206022

品种名称： 捷两优 1057

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 华捷 221S×华恢 1057

特征特性： 籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 119.7 天，比对照 C 两优 343 短 1.3 天。株高 115.3 厘米，亩有效穗 16.6 万穗，每穗总粒数 194.2 粒，结实率 81.3%，千粒重 25.2 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 81.6%，精米率 69.9%，整精米率 53.6%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 20%，垩白度 4.5%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 60 毫米,直链淀粉含量 16.6%，稻米蒸煮食用感官评价 84.1 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 624.8 千克，比对照增产 2.8%；2019 年续试，平均亩产 606.1 千克，比对照减产 0.6%；两年区域试验平均亩产 615.5 千克，比对照增产 1.1%。2019 年生产试验，平均亩产 581.8 千克，比对照增产 0.9%。

栽培技术要点： 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 10-11 千克、五氧化二磷 5 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、稻曲病、纹枯病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206023

品种名称： 彦两优黄莉占

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南兴隆种业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司

品种来源： 彦 S×黄莉占

特征特性： 籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 125.5 天，比对照 C 两优 343 长 4.6 天。株高 122.2 厘米，亩有效穗 17.2 万穗，每穗总粒数 198.5 粒，结实率 85.5%，千粒重 24.3 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 80.8%，精米率 71.4%，整精米率 62.4%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 16%，垩白度 3.9%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 15.7%，稻米蒸煮食用感官评价 80.2 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加中稻迟熟二组绿色通道区域试验，平均亩产 634.0 千克，比对照增产 4.4%；2019 年续试，平均亩产 610.1 千克，与对照相当；两年区域试验平均亩产 622.1 千克，比对照增产 2.2%。2019 年生产试验，平均亩产 571.3 千克，比对照减产 0.9%。

栽培技术要点： 5 月下旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206024

品种名称： 隆晶优 534

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×R534

特征特性： 籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.7 天，比对照 C 两优 343 短 4.2 天。株高 107.2 厘米，亩有效穗 18.9 万穗，每穗总粒数 172.9 粒，结实率 80.3%，千粒重 23.7 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 81.7%，精米率 71.7%，整精米率 63.9%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 13%，垩白度 3.8%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 57 毫米，直链淀粉含量 15.3%，稻米蒸煮食用感官评价 81.4 分，米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 629.4 千克，比对照增产 1.2%；2019 年续试，平均亩产 585.2 千克，比对照减产 4.1%；两年区域试验平均亩产 607.3 千克，比对照减产 1.5%。2019 年生产试验，平均亩产 573.0 千克，比对照减产 0.1%。

栽培技术要点： 6 月初播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206025

品种名称： 五优蒂占

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 五丰 A×蒂占

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种，在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 116.1 天，比对照岳优 9113 长 1.8 天。株高 105.7 厘米，亩有效穗 20.6 万穗，每穗总粒数 152.0 粒，结实率 86.5%，千粒重 24.1 克。抗性：叶瘟 2.8 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 71.2%，整精米率 58.1%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 5%，垩白度 0.8%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.3%，稻米蒸煮食用感官评价 86.3 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻中熟组区域试验，平均亩产 574.8 千克，比对照增产 2.5%；2019 年续试，平均亩产 564.3 千克，比对照增产 2.9%；两年区域试验平均亩产 569.6 千克，比对照增产 2.7%。2019 年生产试验，平均亩产 566.0 千克，比对照增产 1.8%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 20 日以前播种，湘中南 6 月 23-25 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 5 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206026

品种名称： 隆香优 1624

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 隆香 634A×R1624

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 114.5 天，比对照岳优 9113 长 0.9 天。株高 108.2 厘米，亩有效穗 21.9 万穗，每穗总粒数 132.8 粒，结实率 84.6%，千粒重 24.3 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.5%，精米率 69.3%，整精米率 55.0%，粒长 7.6 毫米，长宽比 4.1，垩白粒率 5%，垩白度 1.7%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 63 毫米，直链淀粉含量 15.3%，稻米蒸煮食用感官评价 85.1 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻中熟组区域试验，平均亩产 541.9 千克，比对照减产 2.8%；2019 年续试，平均亩产 550.7 千克，比对照增产 0.4%；两年区域试验平均亩产 546.3 千克，比对照减产 1.2%。2019 年生产试验，平均亩产 565.4 千克，比对照增产 1.7%。

栽培技术要点： 6 月中下旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206027

品种名称： 泽两优 6502

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 华泽 621S×华恢 6502

特征特性： 籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 115.3 天，比对照岳优 9113 长 1.6 天。株高 109.2 厘米，亩有效穗 20.3 万穗，每穗总粒数 134.0 粒，结实率 81.1%，千粒重 26.6 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 4.0 级，稻瘟病综合抗性指数 4.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 80.6%，精米率 70.9%，整精米率 57.2%，粒长 7.7 毫米，长宽比 3.9，垩白粒率 9%，垩白度 2.3%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 69 毫米，直链淀粉含量 14.8%，稻米蒸煮食用感官评价 84.2 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻中熟组区域试验，平均亩产 535.2 千克，比对照减产 4.0%；2019 年续试，平均亩产 547.5 千克，比对照减产 0.2%；两年区域试验平均亩产 541.4 千克，比对照减产 2.1%。2019 年生产试验，平均亩产 557.9 千克，比对照增产 0.3%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 20 日以前播种，湘中南 6 月 23-25 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6.0 万以上。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206028

品种名称： 隆晶优 2911

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×华恢 2911

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 120.7 天，比对照天优华占长 0.7 天。株高 107.9 厘米，亩有效穗 19.0 万穗，每穗总粒数 147.4 粒，结实率 83.6%，千粒重 26.3 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 3.4 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.5%，精米率 72.5%，整精米率 58.8%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 7%，垩白度 1.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.3%，稻米蒸煮食用感官评价 84.0 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 584.1 千克，比对照增产 1.4%；2019 年续试，平均亩产 592.7 千克，比对照减产 0.7%；两年区域试验平均亩产 588.4 千克，比对照增产 0.4%。2019 年生产试验，平均亩产 574.4 千克，比对照减产 1.3%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6.0 万以上。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，主攻前期分蘖，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206029

品种名称： 隆科丝苗 14 号

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 黄广油占/（谷梅 4 号/中鉴 17//华恢 4 号///金山软占////象牙香占）//（R608/谷梅//R608///R608）

特征特性： 籼型常规晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 118.4 天，比对照天优华占短 1.7 天。株高 108.3 厘米，亩有效穗 17.8 万穗，每穗总粒数 151.2 粒，结实率 84.5%，千粒重 23.7 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 69.2%，整精米率 63.2%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 8%，垩白度 1%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 14.6%，稻米蒸煮食用感官评价 86.7 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 510.9 千克，比对照减产 11.3%；2019 年续试，平均亩产 556.9 千克，比对照减产 6.7%；两年区域试验平均亩产 533.9 千克，比对照减产 9.0%。2019 年生产试验，平均亩产 557.9 千克，比对照减产 6.2%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 12-15 千克，大田亩用种量 2.5-3.5 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 4-5 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 8-9 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206030

品种名称： 妙两优 1221

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 妙 S×R1221

特征特性： 籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 115.9 天，比对照天优华占短 4.4 天。株高 103.5 厘米，亩有效穗 19.7 万穗，每穗总粒数 153.2 粒，结实率 85.2%，千粒重 23.3 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 72.2%，整精米率 66.1%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 12%，垩白度 2.3%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 73 毫米，直链淀粉含量 16.1%，稻米蒸煮食用感官评价 83.4 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 565.1 千克，比对照减产 0.5%；2019 年续试，平均亩产 570.1 千克，比对照减产 4.5%；两年区域试验平均亩产 567.6 千克，比对照减产 2.5%。2019 年生产试验，平均亩产 590.5 千克，比对增产 1.5%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206031

品种名称： 隆晶优 3135

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×华恢 3135

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 120.2 天，与对照天优华占相当。株高 111.1 厘米，亩有效穗 18.3 万穗，每穗总粒数 164.5 粒，结实率 84.1%，千粒重 26.0 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.4 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.2，白叶枯病 6 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 70.8%，整精米率 58.2%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 5%，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.8%，稻米蒸煮食用感官评价 84.1 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 592.2 千克，比对照增产 4.3%；2019 年续试，平均亩产 592.9 千克，比对照减产 0.7%；两年区域试验平均亩产 592.6 千克，比对照增产 1.8%。2019 年生产试验，平均亩产 582.5 千克，比对照减产 2.1%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 5 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206032

品种名称： 隆晶优 5842

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×华恢 5842

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 120.5 天，比对照天优华占长 0.3 天。株高 108.1 厘米，亩有效穗 19.1 万穗，每穗总粒数 164.0 粒，结实率 83.9%，千粒重 24.6 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 80.7%，精米率 69.5%，整精米率 58.7%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 7%，垩白度 1.3%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.3%，稻米蒸煮食用感官评价 85.3 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 582.7 千克，比对照增产 2.6%；2019 年续试，平均亩产 589.0 千克，比对照减产 1.4%；两年区域试验平均亩产 585.9 千克，比对照增产 0.6%。2019 年生产试验，平均亩产 592.9 千克，比对照减产 0.3%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6.0 万以上。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206033

品种名称： 隆晶优 2636

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×华恢 2636

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 120.5 天，比对照天优华占长 1.2 天。株高 118.2 厘米，亩有效穗 17.9 万穗，每穗总粒数 155.9 粒，结实率 83.6%，千粒重 26.2 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 2.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 70.1%，整精米率 59.0%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 6%，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.0%，稻米蒸煮食用感官评价 84.3 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 560.3 千克，比对照减产 3.2%；2019 年续试，平均亩产 592.6 千克，比对照增产 0.9%；两年区域试验平均亩产 576.5 千克，比对照减产 1.2%。2019 年生产试验，平均亩产 589.0 千克，比对照减产 2.8%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6.0 万以上。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 5 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、纹枯病、南方黑条矮缩病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206034

品种名称： 莉优 1221

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 莉丰 A×R1221

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 119.8 天，比对照天优华占长 0.2 天。株高 99.9 厘米，亩有效穗 21.0 万穗，每穗总粒数 142.2 粒，结实率 86.3%，千粒重 24.3 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 80.3%，精米率 71.5%，整精米率 56.9%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 9%，垩白度 2.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 62 毫米，直链淀粉含量 16.9%，稻米蒸煮食用感官评价 82.7 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 556.1 千克，比对照减产 2.1%；2019 年续试，平均亩产 572.9 千克，比对照减产 2.4%；两年区域试验平均亩产 564.5 千克，比对照减产 2.3%。2019 年生产试验，平均亩产 595.9 千克，比对照减产 1.7%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206035

品种名称： 妙两优 3287

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 妙 S×K3287

特征特性： 籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 116.0 天，比对照天优华占短 5.0 天。株高 104.6 厘米，亩有效穗 21.5 万穗，每穗总粒数 148.5 粒，结实率 85.0%，千粒重 23.3 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.3%，精米率 71.0%，整精米率 65.1%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 12%，垩白度 2.3%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.5%，稻米蒸煮食用感官评价 82.0 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 575.1 千克，比对照增产 2.7%；2019 年续试，平均亩产 583.6 千克，比对照减产 1.0%；两年区域试验平均亩产 579.4 千克，比对照增产 0.9%。2019 年生产试验，平均亩产 587.6 千克，比对照减产 2.1%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206036

品种名称： 妙两优 2056

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 妙 S×R2056

特征特性： 籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 117.7 天，比对照天优华占短 3.3 天。株高 108.6 厘米，亩有效穗 21.5 万穗，每穗总粒数 144.8 粒，结实率 84.7%，千粒重 23.0 克。抗性：叶瘟 3.9 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.1，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 79.8%，精米率 68.0%，整精米率 57.4%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.9，垩白粒率 7%，垩白度 1.1%，透明度 2 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.7%，稻米蒸煮食用感官评价 86.4 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 554.5 千克，比对照减产 1.0%；2019 年续试，平均亩产 563.7 千克，比对照减产 4.4%；两年区域试验平均亩产 559.1 千克，比对照减产 2.7%。2019 年生产试验，平均亩产 575.5 千克，比对照减产 4.1%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206037

品种名称： 莉优 058

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 莉丰 A×R058

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 120.4 天，比对照天优华占短 0.6 天。株高 102.9 厘米，亩有效穗 21.3 万穗，每穗总粒数 152.3 粒，结实率 79.9%，千粒重 23.9 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 6.4 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.1%，精米率 71.0%，整精米率 58.6%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 13%，垩白度 2.8%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 18.2%，稻米蒸煮食用感官评价 83.1 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 578.4 千克，比对照增产 3.3%；2019 年续试，平均亩产 572.4 千克，比对照减产 2.9%；两年区域试验平均亩产 575.4 千克，比对照增产 0.2%。2019 年生产试验，平均亩产 574.3 千克，比对照减产 3.1%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8-10 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206038

品种名称： 隆科丝苗 13 号

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：（谷梅 4 号/中鉴 17//华恢 4 号///金山软占////象牙香占）/（华恢 451/谷梅 4 号//华恢 451///华恢 451）

特征特性： 籼型常规晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 122.5 天，比对照天优华占长 1.6 天。株高 110.8 厘米，亩有效穗 18.9 万穗，每穗总粒数 140.6 粒，结实率 81.7%，千粒重 24.2 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 67.9%，整精米率 55.2%，粒长 7.5 毫米，长宽比 4.2，垩白粒率 3%，垩白度 0.5%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.6%，稻米蒸煮食用感官评价 86.7 分，米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 527.7 千克，比对照减产 5.8%；2019 年续试，平均亩产 548.5 千克，比对照减产 6.9%；两年区域试验平均亩产 538.1 千克，比对照减产 6.4%。2019 年生产试验，平均亩产 568.4 千克，比对照减产 4.5%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 12-15 千克，大田亩用种量 2.5-3.0 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 4-5 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，一般亩施纯氮 8-9 千克、五氧化二磷 6 千克、氧化钾 6 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌断水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20206039

品种名称： 隆晶优 1195

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 隆晶 4302A×华恢 1195

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 120.7 天，比对照天优华占短 0.3 天。株高 108.7 厘米，亩有效穗 19.9 万穗，每穗总粒数 158.5 粒，结实率 83.1%，千粒重 25.7 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.6，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 80.5%，精米率 69.8%，整精米率 60.3%，粒长 7.6 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 4%，垩白度 1.2%，透明度 2 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.5%。在 2018 年湖南省第十二次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现： 2018 年参加绿色通道晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 584.1 千克，比对照增产 4.3%；2019 年续试，平均亩产 567.9 千克，比对照减产 3.7%；两年区域试验平均亩产 576.0 千克，比对照增产 0.3%。2019 年生产试验，平均亩产 586.6 千克，比对照减产 1.0%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6.0 万以上。需肥水平中等，一般亩施纯氮 9-10 千克、五氧化二磷 5 千克、氧化钾 6.5 千克，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。够苗及时晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期保持田面有水，收割前 7-10 天断水，忌脱水过早，以防早衰和影响品质。坚持强氯精浸种，秧田期抓好稻飞虱防治以预防南方黑条矮缩病，大田期根据病虫预报，及时防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、南方黑条矮缩病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经隆平高科自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审玉 20200001

品种名称：先玉 1795

申 请 者：铁岭先锋种子研究有限公司

育 种 者：铁岭先锋种子研究有限公司

品种来源：PH11VR×PHSAJ

特征特性：在湖南省做春玉米种植，生育期 113.5 天，比对照长 5.1 天。株型半紧凑型，株高 291.7 厘米，穗位高 105.7 厘米，穗长 20.2 厘米，秃尖长 1.1 厘米，穗粗 4.9 厘米，穗行数 16.1 行，行粒数 39.7 粒，穗轴红色，籽粒半马齿型，黄色，百粒重 31.2 克。田间表现空秆率 2.0%，无倒伏，倒折率 0.1%，大斑病 1.2 级，小斑病 1.4 级，纹枯病 2.0 级，茎腐病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。抗病性鉴定：感纹枯病，中抗小斑病，高抗茎腐病。籽粒容重 758 克/升，粗蛋白质含量 9.13%，粗脂肪含量 3.92%，粗淀粉含量 73.59%，赖氨酸含量 0.29%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产 580.7 千克，比对照增产 6.2%；2019 年续试，平均亩产 510.0 千克，比对照增产 3.7%；两年区域试验平均亩产 545.4 千克，比对照增产 5.0%。2019 年生产试验，平均亩产 530.1 千克，比对照增产 9.1%。

栽培技术要点：湘南 3 月中下旬，湘中 3 月下旬，湘西北 3 月底 4 月初播种，每亩种植 3800-4000 株。施足基肥，亩施农家肥 1500 千克，三元复合肥 40 千克，在四叶期至拔节期亩施尿素 15 千克。注意防治纹枯病、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200002

品种名称：沣玉 1 号

申 请 者：湖南省作物研究所

育 种 者：湖南省作物研究所、湖南粮安科技股份有限公司、绵阳市农业科学研究院

品种来源：618 选×绵 PCH6323

特征特性：在湖南省做春玉米种植，生育期 112.3 天，比对照长 3.9 天。株型半紧凑型，株高 261.2 厘米，穗位高 104.7 厘米，穗长 20.0 厘米，秃尖长 1.0 厘米，穗粗 4.8 厘米，穗行数 14.8 行，行粒数 38.5 粒，穗轴红色，籽粒半马齿型，黄色，百粒重 32.7 克。田间表现空秆率 1.7%，倒伏 0.2%，倒折 0.1%，大斑病 1.0 级，小斑病 1.3 级，纹枯病 2.0 级，茎腐病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。抗病性鉴定：感纹枯病，抗小斑病，高抗茎腐病。籽粒容重 765 克/升，粗蛋白质含量 9.1%，粗脂肪含量 5.22%，粗淀粉含量 73.05%，赖氨酸含量 0.31%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产 563.4 千克，比对照增产 3.0%；2019 年续试，平均亩产 526.2 千克，比对照增产 7.0%；两年区域试验平均亩产 544.8 千克，比对照增产 5.0%。2019 年生产试验，平均亩产 537.4 千克，比对照增产 5.4%。

栽培技术要点：湘中南 3 月中旬，湘西北 3 月中下旬播种，每亩种植 3500-4000 株。开沟排水，亩用三元复合肥 40-50 千克，拔节期至大喇叭口期亩施尿素 15-20 千克。注意防治纹枯病、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200003

品种名称：湘农玉 29 号

申 请 者：湖南农业大学

育 种 者：湖南农业大学

品种来源：T01×Z03-1

特征特性：在湖南省做春玉米种植，生育期 113.0 天，比对照长 4.6 天。株型半紧凑型，株高 242.3 厘米，穗位高 90.5 厘米，穗长 19.2 厘米，秃尖长 0.5 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 15.8 行，行粒数 38.4 粒，穗轴红色，籽粒半马齿型，黄色，百粒重 32.8 克。田间表现空秆率 0.8%，倒伏率 0.2%，无倒折，大斑病 1.2 级，小斑病 1.3 级，纹枯病 2.2 级，茎腐病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。抗病性鉴定：中抗纹枯病，中抗小斑病，感茎腐病。籽粒容重 766 克/升，粗蛋白质含量 9.38%，粗脂肪含量 5.33%，粗淀粉含量 73.22%，赖氨酸含量 0.29%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产 575.3 千克，比对照增产 5.2%；2019 年续试，平均亩产 521.3 千克，比对照增产 6.0%；两年区域试验平均亩产 548.3 千克，比对照增产 5.6%。2019 年生产试验，平均亩产 517.3 千克，比对照增产 7.1%。

栽培技术要点：湘南 3 月中下旬，湘中 3 月下旬，湘西北 3 月底 4 月初播种，每亩种植 3800-4200 株。施足基肥，亩施农家肥 1000 千克，三元复合肥 40 千克，在四叶期至拔节期亩施尿素 20-30 千克。注意防治纹枯病、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200004

品种名称：湘农玉 27 号

申 请 者：湖南农业大学

育 种 者：湖南农业大学

品种来源：T01×I03-1

特征特性：在湖南省作春玉米种植，生育期 109.7 天，比对照长 2.9 天，幼苗叶鞘紫色，株型半紧凑型，株高 272.4 厘米，穗位高 114.5 厘米，成株叶片数 16-18 片，果穗长筒型，穗长 20.0 厘米，秃尖长 1.2 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 14.8 行，行粒数 36.4 粒，穗轴粉色，籽粒马齿型，黄色，百粒重 36.8 克。田间表现空秆率 0.3%，倒伏率 0.6%，倒折率 0.8%，大斑病 1.0 级，小斑病 1.2 级，纹枯病 1.7 级，玉米螟 1.0 级，灰斑病 1.0 级，茎腐病 1.0 级。籽粒容重 752 克/升，粗蛋白质含量 10.67%，粗脂肪含量 4.60%，粗淀粉含量 71.28%，赖氨酸含量 0.33%。

产量表现：2016 年参加湖南省区域试验，平均亩产 545.6 千克，比对照增产 7.5%；2017 年续试，平均亩产 551.3 千克，比对照增产 10.8%；两年区域试验平均亩产 548.5 千克，比对照增产 9.2%。2017 年生产试验，平均亩产 483.6 千克，比对照增产 8.3%。

栽培技术要点：湘南 3 月 15-30 日，湘中 3 月 20 日至 4 月 5 日，湘西北 3 月 25 日至 4 月 10 日播种，每亩种植 4000-4500 株。施足基肥，亩施农家肥 1500 千克，三元复合肥 40 千克，在四叶期至拔节期亩施尿素 8 千克。注意防治纹枯病、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200005

品种名称：福玉 10 号

申 请 者：湖南继福种业科技有限公司

育 种 者：湖南继福种业科技有限公司

品种来源：E538×毛白 11

特征特性：在湖南省做春玉米种植，生育期 116.0 天，比对照长 0.5 天。幼苗叶鞘绿色，株型半紧凑型，株高 256.8 厘米，穗位高 121.2 厘米，成株叶片数 18-20 片，果穗长筒型，穗长 19.7 厘米，秃尖长 0.8 厘米，穗粗 5.0 厘米，穗行数 14.7 行，行粒数 38.8 粒，穗轴白色，籽粒马齿型，浅黄色，百粒重 33.2 克。田间表现无空秆、倒伏、倒折，大斑病 1.2 级，小斑病 1.6 级，纹枯病 2.1 级，茎腐病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。抗病性鉴定：抗纹枯病，中抗小斑病，高抗茎腐病。籽粒容重 775 克/升，粗蛋白质含量 10.88%，粗脂肪含量 4.99%，粗淀粉含量 72.21%，赖氨酸含量 0.29%。

产量表现：2017 年参加湖南省区域试验，平均亩产 490.1 千克，比对照增产 7.3%；2019 年续试，平均亩产 508.7 千克，比对照增产 4.2%；两年区域试验平均亩产 499.4 千克，比对照增产 5.8%。2019 年生产试验，平均亩产 541.3 千克，比对照增产 9.4%。

栽培技术要点：湘南 3 月上中旬、湘中 3 月中旬、湘西北 3 月中下旬播种，每亩种植 3200-3500 株。施足基肥，亩施三元复合肥 50 千克，农家肥 1000 千克，在四叶期至拔节期亩施尿素 10 千克，大喇叭口期亩施尿素 15 千克和钾肥 5-10 千克。注意防治纹枯病、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200006

品种名称：玉农晶糯

申 请 者：江西省玉丰种业有限公司

育 种 者：江西农业大学农学院

品种来源：21B-3×9-C-2

特征特性：糯玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 86.0 天，比对照中糯 304 早 0.4 天。株型紧凑，株高 211.6 厘米，穗位高 94.1 厘米，穗长 18.5 厘米，穗粗 4.7 厘米，秃尖长 1.1 厘米，穗行数 12.6 行，行粒数 37.0 粒，籽粒白色，鲜百粒重 34.1 克，鲜出籽率 72.7%。田间表现双穗率 9.8%，空秆率 2.2%，倒伏率 2.3%，倒折率 1.3%，大斑病 1.0 级，小斑病 1.0 级，纹枯病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。鲜果穗品质评分 88.6 分。品质检测：直链淀粉（干基）占粗淀粉总量比率 2.4%。

产量表现:2017 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 762.8 千克，比对照增产 3.2%; 2018 年续试，鲜果穗亩产 736.8 千克，比对照增产 1.8%; 两年区域试验鲜果穗平均亩产 749.8 千克，比对照增产 2.5%。2018 年生产试验，平均亩产 738.8 千克，比对照增产 1.5%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培注意土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 2500-3000 株，授粉后 20-23 天收获为佳。苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，注意及时防控草地贪夜蛾。肥水管理以促为主。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春糯玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200007

品种名称：玉农花彩糯 7 号

申 请 者：江西省玉丰种业有限公司

育 种 者：江西农业大学农学院、江西省玉丰种业有限公司

品种来源：Y01-18×Y03-05

特征特性：糯玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 85.8 天，比对照中糯 304 早 0.7 天。株型紧凑，株高 196.4 厘米，穗位高 77.2 厘米，果穗锥型，穗长 18.5 厘米，穗粗 4.7 厘米，秃尖长 1.3 厘米，穗行数 12.8 行，行粒数 34.7 粒，籽粒紫白色，鲜百粒重 34.5 克，鲜出籽率 73.2%。田间表现双穗率 11.5%，空秆率 2.4%，倒伏率 1.5%，倒折率 1.2%，大斑病 1.0 级，小斑病 1.0 级，纹枯病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。鲜果穗品质评分 88.6 分。品质检测：直链淀粉（干基）占粗淀粉总量比率 1.77%。

产量表现：2017 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 747.2 千克，比对照增产 1.1%；2018 年续试，鲜果穗亩产 764.1 千克，比对照增产 5.6%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 755.7 千克，比对照增产 3.4%。2018 年生产试验，平均亩产 785.7 千克，比对照增产 7.9%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培注意土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 2500-3000 株，授粉后 20-23 天收获为佳。苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，注意及时防控草地贪夜蛾。肥水管理以促为主。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春糯玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200008

品种名称：甜加糯 968

申 请 者：南京秋田种业有限公司

育 种 者：南京秋田种业有限公司、中国科学院亚热带农业生态研究所

品种来源：STN13×NN12

特征特性：甜加糯玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 86.7 天，比对照中糯 304 早 1.0 天。株型半紧凑，株高 233.7 厘米，穗位高 84.7 厘米，果穗锥型，穗长 18.8 厘米，穗粗 5.0 厘米，秃尖长 1.4 厘米，穗行数 14.3 行，行粒数 36.3 粒，粒色白色，鲜百粒重 39.4 克，鲜出籽率 71.9%。田间表现双穗率 2.3%，空秆率 0.3%，无倒伏倒折，大斑病 1.0 级，小斑病 1.0 级，纹枯病 1.2 级，玉米螟 1.0 级。鲜果穗品质评分平均 86.6 分。品质检测：直链淀粉（干基）占粗淀粉总量比率 4.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 752.0 千克，比对照增产 2.9%；2019 年续试，鲜果穗亩产 778.2 千克，比对照增产 4.0%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 765.1 千克，比对照增产 3.5%。2019 年生产试验，平均亩产 737.7 千克，比对照增产 4.7%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培注意土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3000-3200 株，授粉后 22-25 天收获为佳。苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，注意及时防控草地贪夜蛾。肥水管理以促为主。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春糯玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200009

品种名称：苏香糯 1875

申 请 者：南京秋田种业有限公司

育 种 者：南京秋田种业有限公司

品种来源：W18×A75-5

特征特性：糯玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 87.2 天，比对照中糯 304 早 0.5 天。株型半紧凑，株高 220.5 厘米，穗位高 83.4 厘米，果穗锥型，穗长 18.8 厘米，穗粗 4.9 厘米，秃尖长 0.5 厘米，穗行数 14.9 行，行粒数 36.1 粒，籽粒白色，鲜百粒重 39.3 克，鲜出籽率 70.9%。田间表现双穗率 1.1%，空秆率 0.1%，无倒伏倒折，大斑病 1.0 级，小斑病 1.0 级，纹枯病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。鲜果穗品质评分平均 87.2 分。品质检测：直链淀粉（干基）占粗淀粉总量比率 2.5%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 794.3 千克，比对照增产 8.7%；2019 年续试，鲜果穗亩产 786.7 千克，比对照增产 5.2%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 790.5 千克，比对照增产 7.0%。2019 年生产试验，平均亩产 752.8 千克，比对照增产 6.8%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培注意土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3000-3200 株，授粉后 22-25 天收获为佳。苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，注意及时防控草地贪夜蛾。肥水管理以促为主。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春糯玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200010

品种名称：沣甜糯 3 号

申 请 者：湖南省作物研究所

育 种 者：湖南省作物研究所、湖南粮安科技股份有限公司

品种来源：LH02× Sx104

特征特性：甜加糯玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 84.9 天，比对照中糯 304 早 2.7 天。株型半紧凑，株高 218.2 厘米，穗位高 82.9 厘米，穗型锥型，穗长 19.2 厘米，穗粗 4.7 厘米，秃尖长 1.3 厘米，穗行数 14.8 行，行粒数 37.0 粒，籽粒白紫色，鲜百粒重 39.1 克，鲜出籽率 72.4%。田间表现双穗率 0.6%，空秆率 0.5%，无倒伏倒折，大斑病 1.0 级，小斑病 1.0 级，纹枯病 1.4 级，玉米螟 1.0 级。鲜果穗品质评分 88.2 分。品质检测：直链淀粉（干基）占粗淀粉总量比率 1.46%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 799.8 千克，比对照增产 9.5%; 2019 年续试，鲜果穗亩产 788.5 千克，比对照增产 5.4%; 两年区域试验鲜果穗平均亩产 794.2 千克，比对照增产 7.5%。2019 年生产试验，平均亩产 752.4 千克，比对照增产 6.8%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培注意土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3200-3500 株，授粉后 21-23 天收获为佳。苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，注意及时防控草地贪夜蛾。肥水管理以促为主。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春糯玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200011

品种名称：湘农甜玉 3 号

申 请 者：湖南农业大学

育 种 者：湖南农业大学

品种来源：C9501×HZ-3

特征特性：甜玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 88.2 天，比对照粤甜 16 号长 1.7 天。株型平展，株高 237.9 厘米，穗位高 89.9 厘米，穗长 20.4 厘米，穗粗 4.8 厘米，秃尖长 1.3 厘米，穗行数 14.3 行，行粒数 40.3 粒，籽粒黄色，鲜百粒重 40.6 克，鲜出籽率 72.5%。田间表现双穗率 2.2%，空秆率 0.1%，无倒伏倒折，大斑病 1.0 级，小斑病 1.0 级，纹枯病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。鲜果穗品质评分 88.3 分。品质检测：可溶性总糖含量 15.3%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 838.0 千克，比对照增产 4.3%；2019 年续试，鲜果穗亩产 801.7 千克，比对照增产 3.1%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 819.9 千克，比对照增产 3.7%。2019 年生产试验，平均亩产 886.1 千克，比对照增产 6.7%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培注意土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3000-3200 株，授粉后 20-22 天收获为佳。苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，注意及时防控草地贪夜蛾。肥水管理以促为主。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春甜玉米种植。

审定编号：湘审玉 20200012

品种名称：荟甜 192

申 请 者：科荟种业股份有限公司

育 种 者：科荟种业股份有限公司

品种来源：T197×T23

特征特性：甜玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 86.7 天，与对照粤甜 16 号相当。株型半紧凑，株高 224.6 厘米，穗位高 84.5 厘米，穗长 19.9 厘米，穗粗 5.0 厘米，秃尖长 1.0 厘米，穗行数 15.5 行，行粒数 37.2 粒，籽粒黄色，鲜百粒重 40.1 克，鲜出籽率 71.7%。田间表现双穗率 2.4%，空秆率 0.1%，无倒伏倒折，大斑病 1.0 级，小斑病 1.0 级，纹枯病 1.0 级，玉米螟 1.0 级。鲜果穗品质评分 87.9 分。品质检测：可溶性总糖含量 14.7%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 829.5 千克，比对照增产 3.1%；2019 年续试，鲜果穗亩产 797.8 千克，比对照增产 2.6%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 813.7 千克，比对照增产 2.9%。2019 年生产试验，平均亩产 868.3 千克，比对照增产 4.0%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培注意土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3000-3200 株，授粉后 23-25 天收获为佳。苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，注意及时防控草地贪夜蛾。肥水管理以促为主。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春甜玉米种植。

审定编号：湘审豆 20200001

品种名称：湘春 2901

申 请 者：湖南省作物研究所

育 种 者：湖南省作物研究所

品种来源：油春 06-8×湘春豆 26

特征特性：粒用春大豆品种。生育期 107 天，比对照湘春豆 24 长 5.0 天。株高 60.0 厘米，有效分枝 2.9 个，主茎节 11.6 个。株型收敛，有限结荚习性，白花，灰毛，单株有效荚数 31.8 个，单株粒数 62.7 粒，单株粒重 13.3 克，荚熟时黄色，底荚高度 11.5 厘米。籽粒椭圆形，种皮黄色，子叶黄色，种脐褐色，百粒重 22.3 克。抗大豆花叶病毒病、霜霉病、细菌性斑点病。品质：粗蛋白质含量 40.0%，粗脂肪含量 21.74%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产 194.2 千克，比对照增产 4.7%；2019 年续试，平均亩产 190.5 千克，比对照增产 5.9%；两年区域试验平均亩产 192.4 千克，比对照增产 5.3%。2019 年生产试验，平均亩产 173.8 千克，比对照增产 4.2%。

栽培技术要点：3 月下旬至 4 月上旬播种，行距 40 厘米，条播株距 10 厘米，穴播每穴留苗 2 株，穴距 20 厘米，亩种植密度 1.67 万株。亩施 50 公斤钙镁磷肥作基肥，分枝期根据苗情亩追施氮磷钾三元复合肥 10-15 千克。及时防虫治病，豆苗封行前中耕除草。遇涝排渍，遇旱灌水。

审定意见：该品种符合湖南省大豆品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春大豆种植。

审定编号：湘审豆 20200002

品种名称：湘春豆 30 号

申 请 者：湖南省作物研究所

育 种 者：湖南省作物研究所

品种来源：沔 295×滇豆 8 号

特征特性：粒用春大豆品种。生育期 105 天，比对照湘春豆 24 长 3 天。株高 59.9 厘米，有效分枝 3.2 个，主茎节 11.7 个。株型收敛，有限结荚习性，白花，灰毛，单株有效荚数 29.8 个，单株粒数 58.7 粒，单株粒重 12.6 克，荚熟时黄色，底荚高度 11.5 厘米。籽粒椭圆形，种皮黄色，子叶黄色，种脐褐色，百粒重 22.4 克。抗大豆花叶病毒病、霜霉病、细菌性斑点病。品质：粗蛋白质含量 39.75%，粗脂肪含量 21.69%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产 196.6 千克，比对照增产 6.0%；2019 年续试，平均亩产 189.2 千克，比对照增产 5.2%；两年区域试验平均亩产 192.9 千克，比对照增产 5.6%。2019 年生产试验，平均亩产 173.3 千克，比对照增产 3.8%。

栽培技术要点：3 月下旬至 4 月上旬播种，行距 40 厘米，条播株距 10 厘米，穴播每穴留苗 2 株，穴距 20 厘米，亩种植密度 1.67 万株。亩施 50 公斤钙镁磷肥作基肥，分枝期根据苗情亩追施氮磷钾三元复合肥 10-15 千克。及时防虫治病，豆苗封行前中耕除草。遇涝排渍，遇旱灌水。

审定意见：该品种符合湖南省大豆品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春大豆种植。

审定编号：湘审豆 20200003

品种名称：湘春黑豆 31

申 请 者：湖南省作物研究所

育 种 者：湖南省作物研究所

品种来源：黑 363×鄂豆 4 号

特征特性：粒用春大豆品种。生育期 107 天，比对照湘春豆 24 长 5 天。株高 47.0 厘米，有效分枝 2.8 个，主茎节 12.0 个。株型收敛，有限结荚习性，白花，灰毛，单株有效荚数 32.2 个，单株粒数 61.3 粒，单株粒重 12.5 克，荚熟时黄色，底荚高度 9.5 厘米。籽粒椭圆形，种皮黑色，子叶黄色，种脐黑色，百粒重 20.9 克。抗大豆花叶病毒病、霜霉病、细菌性斑点病。品质：粗蛋白质含量 41.4%，粗脂肪含量 22.54%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产 197.2 千克，比对照增产 6.3%；2019 年续试，平均亩产 189.4 千克，比对照增产 5.3%；两年区域试验平均亩产 193.3 千克，比对照增产 5.8%。2019 年生产试验，平均亩产 178.9 千克，比对照增产 7.2%。

栽培技术要点：3 月下旬至 4 月上旬播种，行距 40 厘米，条播株距 10 厘米，穴播每穴留苗 2 株，穴距 20 厘米，亩种植密度 1.67 万株。亩施 50 公斤钙镁磷肥作基肥，分枝期根据苗情亩追施氮磷钾三元复合肥 10-15 千克。及时防虫治病，豆苗封行前中耕除草。遇涝排渍，遇旱灌水。

审定意见：该品种符合湖南省大豆品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春大豆种植。

审定编号：湘审棉 20200001

品种名称：湘 X1067

申 请 者：湖南省棉花科学研究所

育 种 者：湖南省棉花科学研究所

品种来源：G1201×湘 267

特征特性：转抗虫基因中早熟杂交棉品种。湖南春播生育期 120.8 天，比对照湘杂棉 7 号短 0.2 天。株高 130.1 厘米，茎秆茸毛较少，叶片中等大小，叶色浅绿，花药白色。铃呈卵圆形，单株成铃 46.5 个，单铃籽棉重 6.3 克，衣分 43.0%，籽指 11.0 克，衣指 8.1 克，霜前花率 99.0%。抗性：枯萎病病指 15.1，耐枯萎病；黄萎病病指 27.2，耐黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 28.6 毫米，断裂比强度 32.6 厘牛/特克斯，马克隆值 5.2，纺纱均匀性指数 147.2。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产皮棉 126.1 千克，比对照增产 10.5%；2019 年续试，平均亩产皮棉 126.1 千克，比对照增产 7.9%；两年区域试验平均亩产皮棉 126.1 千克，比对照增产 9.2%。2019 年生产试验，平均亩产皮棉 118.8 千克，比对照增产 9.3%。

栽培技术要点：4 月中旬营养钵育苗移栽，或 5 月上旬前直播，每亩种植 2500-3000 株，行距 90-100 厘米。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，花铃期依长势适量追肥。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，对蕾铃期害虫应根据虫情预报及时防治。

审定意见：该品种符合湖南省棉花品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省棉区种植。黄萎病重发区不宜种植。

审定编号：湘审棉 20200002

品种名称：中棉所 126

申 请 者：中国农业科学院棉花研究所

育 种 者：中国农业科学院棉花研究所

品种来源： 071239×中棉所 94A1822

特征特性：转抗虫基因早熟常规棉品种。湖南夏播生育期 98.4 天，比对照省工棉 2 号短 3.1 天。株高 104 厘米，茎秆茸毛较多，叶片中等大小，叶色浅绿，花药白色。铃呈卵圆形，单株成铃 22.2 个，单铃籽棉重 5.2 克，衣分 41.3 %，籽指 11.6 克，衣指 7.7 克,霜前花率 100％。抗性：枯萎病病指 16.1，耐枯萎病；黄萎病病指 23.8，耐黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 29.4 毫米，断裂比强度 32.3 厘牛/特克斯，马克隆值 5.3，纺纱均匀性指数 149.3。

产量表现：2018 年参加湖南省机采棉组区域试验,平均亩产皮棉 103.4 千克，比对照增产 3.6%；2019 年续试，平均亩产皮棉 111.7 千克，比对照增产 6.2%；两年区域试验平均亩产皮棉 107.6 千克，比对照增产 4.9%。2019 年生产试验，平均亩产皮棉 109.2 千克，比对照增产 5.1%。

栽培技术要点：5 月中下旬直播，每亩种植 5000-6000 株，行距 70-80 厘米。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，花铃期依长势适量追肥。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，根据虫情预报及时防治蕾铃期害虫。

审定意见：该品种符合湖南省机采棉品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省棉区种植。黄萎病重发区不宜种植。

审定编号：湘审棉 20200003

品种名称：湘 C176

申 请 者：湖南省棉花科学研究所

育 种 者：湖南省棉花科学研究所

品种来源：A152×湘 CH01

特征特性：转抗虫基因优质专用棉品种。湖南春播生育期 115.8 天，比对照湘杂棉 7 号短 0.1 天。株高 120.8 厘米，茎秆有茸毛，叶片中等大小，叶淡绿，花药白色。铃呈卵圆形，单株成铃 34.6 个，单铃籽棉重 5.8 克，衣分 41.4%，子指 12.3 克，衣指 8.4 克，霜前花率 98.1％。抗性：枯萎病病指 19.9，耐枯萎病；黄萎病病指 31.0，耐黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 35.4 毫米，断裂比强度 36.5 厘牛/特克斯，马克隆值 4.1，纺纱均匀性指数 200.8。

产量表现：2018 年多点试验平均亩产皮棉 99.3 千克，比对照增产 0.4%；2019 年多点试验平均亩产皮棉 103.1 千克，比对照增产 3.3%；两年多点试验平均亩产皮棉 101.2 千克，比对照增产 1.9%。2019 年生产试验，平均亩产皮棉 117.2 千克，比对照增产 9.1%。

栽培技术要点：4 月播种，每亩种植 1200-1600 株。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，花铃期依长势适量追肥。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，对蕾铃期害虫应根据虫情预报及时防治。

审定意见：该品种作为优质专用棉品种审定。适宜在湖南省棉区种植。枯、黄萎病重发区不宜种植。

信息公开选项：公开

湖南省农业农村厅办公室　　2020 年 3 月 21 日印发